

Se spune despre ea, în toate scrierile vechi că ar fi fost botezată de Iisus, *Îngerul Pământului*, argila roșie mocirloasă, noroiul argilos putând să tragă durerile, umflăturile, să îndrepte oasele, să omoare tumorile. Se pare că adevărul acesta este: puterile argilei țin aproape de miracol, de minune, de incredibil. Talentele ei multiple o fac să fie utilizată în cele mai diverse suferințe și afecțiuni. Rezultatele obținute sunt de multe ori incredibile, iar o boală vindecată cu ajutorul argilei rareori își mai poate arăta colții. Argila a fost un medicament de prim rang în Antichitate, în Renaștere și devine, azi, un *Medicament Natural al Viitorului*.

Multă sănătate de la ÎNGERUL PĂMÂNTULUI!

îngerul pământului



EDITURA
VENUS

ISBN 973-9024-41-6

A. GORIS A. LIOT P. GORIS

ARGILA

îngerul pământului



Toți știm cum arată, dar foarte puțini dintre noi s-au gândit vreodată că, aidoma unei legume, ori a unui fruct sau, ca și plantele medicinale, argila este un **medicament natural atotputernic**.

La fel ca și plantele ce cresc pe ea și se îmbogățesc în tot felul de substanțe dătătoare de sănătate, pe care le absorb din ea, argila conține numeroase minerale și oligoelemente, în cantități apreciabile.

Utilizarea ei pentru tratamentul multor afecțiuni este foarte veche, de la începuturile lumii, am putea spune. Nu știm de ce, acum, toate puterile ei tămăduitoare au fost uitate. Și este cu atât mai de mirare cu cât, de-a lungul secolelor, civilizația umană a beneficiat din plin de eficiența terapeutică a argilei, o multitudine de boli, deseori foarte grave, fiind vindecate doar cu ajutorul ei.

Este un regenerator fizic deosebit de puternic, acționează ca remineralizant—forte asupra corpului uman, are capacitatea de a reechilibra metabolismul și funcțiile organismului, în general, este un agent antitoxic de excepție.

Toate aceste proprietăți erau bine cunoscute și eficient exploatate încă din Antichitate!

Nu este mai puțin adevărat că, așa cum s-a întâmplat și în alte domenii, nu puține din lucrările, efectuate și scrise, asupra argilei... s-au pierdut! Așa, de pildă, cercetările arheologice contemporane ne-au dezvăluit faptul că egiptenii utilizau argila — datorită proprietăților ei anti-

Printed in Romania
grupul drago print
fed print sa O societate Butan Gas

B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 31, sector 5, București, ROMÂNIA

Telefon: 335.93.18; 335.97.47

Fax: 337.33.77

septice -, la mumificarea cadavrelor. Dar cum făceau acest lucru, nu se știe exact.

Într-una din lucrările sale Zimmermann afirma: „... celor bolnavi, care veneau să-i arate lui Iisus diformitățile ce le aveau, ori membrele, umflate, noduroase... acesta îi îndrepta spre un anume loc de pe malul fluviului, unde se afla un nămol încălzit de razele soarelui.“ Și Iisus adăuga: „Băgați-vă picioarele în acest nămol, într-atât încât îmbrățișarea *Îngerului Pământului* să poată trage din oasele voastre toate otrăvurile și toată suferința ce le roade. Și atunci veți vedea cum Satana și durerile voastre vor fi alungate de îmbrățișarea *Îngerului Pământului*. Și îngroșările oaselor voastre vor dispărea, și membrele voastre se vor îndrepta, și veți fi eliberați de toate durerile.“

Dar textele respective nu spun dacă era vorba de mâini ori de picioare, sau de amândouă, nu spun de ce boală era vorba și nici care au fost rezultatele exacte, gradul exact de însănătoșire, de vindecare, obținut cu acest ... tratament! Dacă ar fi să credem întrutotul spusele textului, ar însemna că, odată, de mult, de foarte mult timp, argila a avut niște virtuți de-a dreptul miraculoase, dar, pe care, de-a lungul timpului, le-a... pierdut. În orice caz, nici tumorile, nici marile diformități osoase nu se vindecă, azi, prin împachetări cu argilă! Ele sunt benefice numai ca tratament pentru calmarea durerilor, în debutul reumatismului sau al artrozei.

Dar..., întotdeauna există un „dar“!

Pe de altă parte, pe Terra există și în prezent populații tribale primitive, departe de orice lume civilizată, care nu au alte mijloace terapeutice, în afara argilei, pentru tratarea

afecțiunilor mai sus-amintite. Și, chiar de nu vă vine să credeți, pare-se că se și vindecă de cumplitele suferințe!

S-ar putea, așadar, ca eșecurile tratamentelor cu băi și cataplasme de argilă, aplicate în anumite leziuni osoase, să ni se datoreze nouă, oamenilor de azi, din lumea civilizată, tehnicizată, robotizată, - electronizată, care trăim altfel, mâncăm altfel, muncim altfel..., ale căror structură internă, mod de reacție, chimisme, biochimisme s-au schimbat radical față de oamenii care au trăit acum două și trei milenii.

Așa încât este posibil ca reacțiile noastre, la anumite metode, substanțe, tehnici terapeutice, să se fi modificat în funcție de modalitățile noastre fiziologice, actuale, de răspuns la un nou medicament sau la un altul, foarte vechi dar de mult uitat, de mult neutilizat.

Așa se pare că s-a întâmplat și cu argila, pentru că toți marii medici ai tuturor timpurilor nu fac decât să o ridice în slăvi!

Dioscoride îi atribuia puteri extraordinare, Pliniu cel Bătrân, Galen, Avicenna, nu-i aduceau decât laude în toate scrierile lor. Ludovic al XIV lea, supranumit Regele Soare, mânca argilă, singura în stare să-i vindece hemoroizii dureroși și fisurile anale de care suferea. Marco Polo afirma că pelerinii ce veneau în orașul sfânt Niabar și se îmbolnăveau de febra „Q“ se vindeau doar înghițând nițel „pământ roșu“ de pe malul lacului aflat în vecinătatea orașului.

Dar și mai aproape de vremurile noastre au existat specialiști care au susținut și dovedit că argila este un remediu terapeutic de excepție.

Profesorul Strumpf, de la Universitatea din Berlin, prescria, în 1903, bolnavilor de holeră asiatică, argilă. Urmare a rezultatelor obținute, librarul A. Just se face propagatorul acestei metode, publicând cărți despre ea.

În timpul Primului Război Mondial, în muștarul destinat unor regimente franceze s-a adăugat și puțină argilă. Rezultatul? Spre deosebire de celelalte unități, soldații acestor regimente nu s-au îmbolnăvit niciodată de dizenterie. Trupele rusești luau cu regularitate argila pe cale bucală.

În Africa, în America de Sud, în India, există multe sate în care argila este un „medicament” la ordinea zilei.

Cura Kneipp utilizează în mod curent un amestec de argilă și de oțet de vin pentru cataplasme și împachetări.

În Germania și în Elveția împachetările cu argilă caldă, la nivelul toracelui, recomandate de anumiți specialiști celor bolnavi, sunt o practică cunoscută, recunoscută și utilizată frecvent. Împachetările pot dura ore în șir ori chiar o noapte întreagă, dacă este necesar.

Și acestea sunt doar câteva dintre multele și nebănuitele haruri pe care le are *Îngerul Pământului*.

PROPRIETĂȚILE ARGILEI

Laureatul Premiului Nobel pentru Medicină și Fiziologie, vestitul medic Alexis Carrel, ca și mulți alți oameni de știință, vorbea deseori despre „inteligența naturii”: „Ei bine, nu râdeți, argila este, în mod sigur, dotată cu o atare calitate, dar această inteligență” – după cum el însuși scria – „nu poate fi explicată cu ajutorul conceptelor noastre medicale actuale”.

Să vedem, totuși, prin ce se manifestă concret, „inteligenta” *Îngerului Pământului*.

- Argila este un **antiseptic** și, ca și toate celelate antiseptice naturale (în special, esențele aromatice), nu are nici unul dintre „păcatele” – ca s-o zicem pe-a dreaptă – multor antiseptice chimice obișnuite care, e adevărat, ucid microbii, dar, din păcate, odată cu ei rănesc, ori chiar distrug, și celulele organismului nostru în care se „cuibăriseră” respectivii microbi.

- Proprietățile bactericide ale argilei sunt deosebit de bine puse în evidență în numeroase stări infecțioase: enterite, colite, colibaciloză, afecțiuni pulmonare, parazi-toze intestinale.

Și vă dăm un exemplu. O rană cu puroi, tratată cu argilă, se vindecă văzând cu ochii, cu o viteză de-a dreptul uimitoare. Puroiul este eliminat și țesutul este refăcut. La fel ca și varza – există multiple asemănări între argilă și varză în ceea ce privește „talentele” lor „medicinale” – *Îngerul Pământului*, indiferent pe ce cale acționează,

externă sau internă, „trage“ supurația și, dezinfectând în totalitate, curăță organismul de toxine.

- Analizele efectuate, încă din 1928, de P. Laborde, profesor la Facultatea de Farmacie din Strassbourg, au stabilit categoric că argila utilizată în tratamente este **sterilă**, cu alte cuvinte **nu conține nici un microb**.

- Argila este **radioactivă**, concentrația ei fiind, de la caz la caz, între 0,3 până la 1,25 unități Mache.

- Este, de asemenea, și un **adsorbant** remarcabil. Decolorează cu ușurință cerneala ori albastrul de metilen, adsoarbe mirosurile urâte, fiind deosebit de eficientă în baie, la WC-uri, în bucătărie, la ghearele de gunoi. Puterea ei adsorbantă este, se pare, cea care poate explica metoda extrem-orientală de conservare a ouălelor. Fiecare dintre noi cred că a auzit sau a citit despre „ouăle clocite“, una din vestitele specialități culinare chineze. Ei bine, nici vorbă de ouă clocite, sunt pur și simplu ouă conservate în pământ argilos.

- Din aceeași putere adsorbantă își trage seva și o altă calitate a argilei, aceea de **antitoxic**. Experiențele de laborator pe animale au dovedit-o din plin. Dacă se dă o cantitate infimă de stricnină unor șoareci, aceștia mor aproape instantaneu. Dar dacă li se dă aceeași doză amestecată cu argilă, suportă otrava fără nici o problemă, ca și cum ar fi mâncat... o delicată!

- Argila este un **decolorant** și un **înălbitor** de marcă. Spălătoresele romane clăteau totdeauna albiturile în apă argiloasă.

- Analiza chimică a argilei verzi spune că ea prezintă:

- siliciu, 49,10%
- alumină, 14,61%
- sescvioxid de fier, 5,65%
- magnezie, 4,24%
- oxizi alcalini, 3,08%
- anhidridă titanică, 0,75%
- apă (umiditate), 7,40%
- pierdere la calcinare, 10,85%

- Ținând cont de o atare compoziție, argila se recomandă:

- ♦ Datorită cantității de **siliciu**, în:

- ateroscleroză
- tuberculoză
- bătrânețe
- stări degenerative multiple

- ♦ Importanța magneziului, fierului și calciului în terapeutică explică rolul curelor argiloase în:

- astenie
- demineralizare
- stări canceroase
- anemii.

SĂ ASCULTĂM DE SFATURILE
ÎNGERULUI PĂMÂNTULUI

SUB CE FORMĂ ESTE UTILIZATĂ ARGILA ÎN TRATAMENTUL PE CALE EXTERNĂ

PASTA

Prepararea pastei de argilă este foarte ușoară. Se toarnă argila într-un vas de sticlă, lemn, porțelan, faianță, niciodată într-unul de plastic ori de metal, și-ncepem să o frecăm ca pe o cremă, adăugând atâta apă cât să fie ușoară frecarea, și să ajungem să obținem o pastă mult mai moale decât cea folosită în sculptură la realizarea mulajelor. Anumiți specialiști recomandă să lăsăm argila acoperită cu apă să stea câteva ore, astfel ca să obținem un noroi omogen.

CATAPLASME, COMPRESE, ÎMPACHETĂRI

Cataplasmele se fac groase de 0,5 cm până la 2 cm și să fie ceva mai mari, mai „întinse“ decât suprafața de piele pe care le aplicăm, pe care trebuie s-o acopere, pe care o „împachetăm“.

În funcție de caz, și primele și ultimele se aplică *reci*, *călduțe* ori *calde*.

Reci se pun pe regiuni inflamate ori în partea inferioară a abdomenului. Ele vor fi schimbate imediat ce se vor

încălzi (cam în 15-30 minute, maximum). Dacă senzația de frig este persistentă, se înlocuiesc aplicațiile reci cu unele călduțe.

Călduțe ori calde se pun pe regiunea hepatică, rinichi, vezică, oase. Ele vor fi aplicate direct pe piele, doar la nevoie pe un tifon.

Există anumite afecțiuni – cele cardiace, contuziile, varicele – care solicită, mai mult sau mai puțin, la începutul tratamentului, aplicarea de *compresse* înainte de-a pune *cataplasme* ori a face o *împachetare*.

Compressele se pregătesc făcând o apă argiloasă subțire (ori o mocirlă foarte limpede!) în care se înmoaie o bucată de pânză, se stoarce ușor și se aplică pe piele.

Fixarea. În funcție de zona afectată, atât *compressele* cât și *cataplasmele* trebuie fixate. În general se utilizează o bandă Velpeau, o centură de flanelă, o fașă în T (pentru perineu), o bandă de contenție fixată în jurul frunții (pentru ceafă).

Durata aplicării procedurilor variază, în funcție de caz, între una-trei ore și o noapte întreagă. Dacă apar senzații neplăcute (frig, durere), se întrerupe procedura și nu se mai reia decât după 12-24 de ore. Dacă o *cataplasma* se usucă prea repede trebuie înlocuită cu o alta preparată pe loc.

Ritmul de aplicare variază în funcție de afecțiunea tratată și de reacția bolnavului.

- **Abces, diferite supurații:** aplicațiile se schimbă inițial din jumătate în jumătate de oră ori din oră în oră; pe măsură ce afecțiunea cedează, ritmul se poate stabiliza la fiecare oră și jumătate, zi-noapte (dacă așa e necesar); în

loc de *cataplasma* ori *împachetare*, noaptea se poate pune și numai o *compresă* cu apă argiloasă, care va fi schimbată o dată sau de două ori pe noapte.

- **Regiunile lombare, abdomen, partea inferioară a pântecelui, regiunea hepatică:** deoarece procedurile făcute în toate aceste regiuni pot provoca reacții mai mult sau mai puțin puternice, este de preferat să se aplice doar o *cataplasma* pe zi, pe care o lăsăm să stea între două și patru ore; există cazuri în care, totuși, *împachetarea* poate fi menținută și o noapte.

Numărul procedurilor este strict limitat la una singură, o dată. Nu se fac, sub nici un motiv, mai multe aplicații simultan. De pildă, dacă este nevoie să punem cataplasme și în regiunea plămânilor și în zona inghinală, între ele se va respecta cu strictețe un interval de două-patru ore.

Contraindicații: în timpul ciclului menstrual nu se vor face nici un fel de proceduri cu argilă.

Recomandări obligatorii:

- După fiecare aplicare, argila utilizată se aruncă pentru că este plină de toate toxinele pe care le-a extras din organism, deci este foarte toxică. Pânza, fașa, tifonul care au fost utilizate se fierb.

- După ce scoatem *compresa* ori *cataplasma*, sau *împachetarea*, pielea trebuie curățată bine de toate resturile de argilă, iar dacă tot mai rămân, particule foarte aderente de piele se spală cu apă rece ori călduță.

- Înainte de orice cură externă de argilă, ori concomitent cu ea, trebuie făcut un tratament dezintoxicant intern cu fitoaromaterapie, suc de lămâie, laxative ușoare, argilă pe gură, alimentație sănătoasă, atoxică.

- O dată începută, cura de argilă nu poate fi întreruptă decât în cazuri excepționale, ea trebuind urmată până când se obțin rezultatele dorite. Cura declanșează un ansamblu de procese succesive – drenaj, revitalizare –, iar oprirea acestora în plina lor desfășurare poate fi nefastă. Chiar la începutul curei se poate observa, ca de altfel în marea majoritate a tuturor celorlalte cure de același gen (așa-numitele cure active), o agravare aparentă a afecțiunii pentru a cărei vindecare se face cura (mărirea unui ulcer, a unei plăgi atone, revenirea temporară a durerilor reumatismale, ori înțepirea lor, sau intensificarea ș.a.).

- Se va începe, întotdeauna, prin utilizarea unor straturi subțiri de argilă, de 0,5 cm, puțin întinse și care vor fi lăsate pe piele maximum, două ore. Progresiv se ajunge la aplicații de 2 cm grosime, de întindere mare și care vor fi lăsate și o noapte, întreagă. Bineînțeles, numai dacă și bolnavul suportă!

PUDRA ȘI PUDRAJELE

Poate fi folosită pe post de talc, atât la copilul mic cât și la cei mari ori adulți. Fie că este utilizat pe răni, fie pe rosături, *pudrajul cu argilă* are acțiune antiseptică și cicatrizantă. De asemenea, rezultate similare se obțin și dacă e vorba de fisuri, crăpături, eczeme, ulcere, anume eriteme.

MASCĂ DE FRUMUSEȚE

Măștile de întreținere a tenului existente în comerț au, de multe ori, argilă. Dar este mult mai economic, mai simplu și mai eficient dacă din argilă și pudră, amestecate cu un dizolvant – format din pe jumătate din suc de castraveți, ori de roșii, sau de struguri și pe jumătate din apă – facem o pastă pe care o întindem, într-un strat subțire, pe față și pe gât. O lăsăm să stea până se usucă (cam 15-30 de minute, în general). O îndepărtăm spălându-ne cu apă caldă. Se face săptămânal. Maska are deosebită eficiență și în caz de acnee, erupții ale feței, cuperoză, riduri.

CREMA

Se amestecă *pudra de argilă* cu untdelemn de măsline și rezultă o *cremă emolientă*, la fel de eficientă ca și *maska de argilă* și în aceleași cazuri ca și ea.

SPĂLĂTURI ȘI INSTILAȚII VAGINALE

La un litru de apă se pun trei până la patru linguri de supă cu argilă. Apa să fie călduță. Se recomandă în caz de metrite, colite, rectite, leucoree (poală albă), parazitoze intestinale.

BĂI DE NĂMOL ARGILOS, PARȚIALE SAU TOTALE

Se prepară un nămol de argilă atât cât să umple o chiuvetă sau un lighean. Baia poate fi utilizată de mai multe ori, de fiecare dată completând cada cu apa caldă necesară. Băile durează, inițial cinci-zece minute, ajungându-se la 15-20 de minute. Se fac o zi da o zi nu, ori de două ori pe săptămână, timp de o lună. Dacă este necesar, se pot repeta după o pauză de trei săptămâni. Ele sunt indicate în special în artritism, afecțiuni reumatismale sau osoase, anemie. Băi parțiale (locale) se vor face când suferim de reumatism la mâini ori la picioare. Este foarte bine ca *băile cu argilă* să fie combinate cu apă sărată cu sare de mare.

CUM ESTE UTILIZATĂ ARGILA ÎN TRATAMENTUL PE CALE INTERNĂ

De foarte mult timp argila face parte din compoziția multor preparate farmaceutice, este mai ușor de luat decât multe alte pulberi medicinale, iar indicațiile ei terapeutice sunt mult mai variate decât a multor altor medicamente.

E foarte important să găsim o argilă cât mai curată, fără impurități, fără nisip, fără să fie amestecată cu nu știu ce produse medicamentoase. La pipăit trebuie să fie untoasă, grasă, mătăsoasă. Aveți grijă să nu fie cumva o argilă arsă! În ceea ce privește culoarea, argila este verde, albă, galbenă, roșie. Dacă faceți câteva testări cu fiecare dintre ele, veți putea stabili cu ușurință care este „culoarea” mai activă pentru afecțiunea dumneavoastră. În general, se recomandă argila din regiunea unde trăiești.

Doza zilnică obișnuită este de o linguriță la trei sferturi de pahar cu apă (o jumătate de linguriță pentru copiii sub 12 ani). Se pare că este mai bine să începeți prin a bea, timp de patru-cinci zile, doar apă argilooasă. Dar există și afecțiuni, cum sunt dizenteria, anemia, tuberculoza, unele maladii gastro-intestinale, pentru care cura trebuie să-nceapă, din contră, direct, brutal, masiv, cu două-trei lingurițe de argilă zilnic.

Argila se prepară de seara, se pune cantitatea respectivă în apă, se lasă toată noaptea, iar dimineața se bea

paharul, după ce s-a amestecat bine lichidul. Dar argila poate fi luată și la culcare, ori cu o jumătate de oră înainte de una din mesele principale.

În caz că apare constipația, micșorați cantitatea de argilă, măriți-o pe cea de apă și beți întreaga doză în două sau trei reprize, cu o jumătate de oră înainte de a mânca.

Și dacă, totuși, constipația persistă, trebuie să între-rupeți cura de argilă pe-gură timp de zece până la 15 zile.

Copiilor care nu pot, într-adevăr, să înghită soluția de argilă, li se pot prepara mici bombițe de argilă cu o infuzie aromatică (muguri de pin, eucalipt, cimbru, mentă). Sugând „bomboanele“, rezultatul va fi similar.

De altfel, dacă e vorba de gingivite, stomatite, puroi alveolar, angine, răceli, se recomandă tocmai o asemenea modalitate de-a lua argila: sugeți bucățele mici din ea.

În ceea ce privește ritmicitatea curelor, părerile specialiștilor nu diferă mult. Marea lor majoritate recomandă o cură „de atac“, ce durează trei săptămâni fără întrerupere, apoi, fie zece zile pe lună, fie o săptămână și două pauză.

Paralel cu o cură de argilă se recomandă o alimentație fără grăsimi și un regim hidric foarte bogat, mai ales între mese, băuturile fiind apă, ceaiuri, citronade.

În caz de epidemii, apa poate fi sterilizată cu ajutorul argilei, datorită tocmai proprietăților ei, pe care le-am detaliat în paginile anterioare: faptul că e antiseptică, bactericidă și adsorbantă explică fără dubiu capacitatea ei sterilizatoare.

În intestin, argila absoarbe gazele și toxinele. De-aceea se administrează îndeosebi bolnavilor atinși de boli contagioase. În cazul afecțiunilor tubului digestiv, trata-

mentul argilos este superior multor altora ca urmare a proprietăților sale cicatrizante, purifiante, reconstructoare (ulcere, cancere, dizenterii, colite, enterite).

Nou-născuții ce au diaree vor reacționa benefic la câteva lingurițe de argilă, administrate zilnic. Dar și constipația poate beneficia – paradoxal, nu? – de un acelaș tratament.

Datorită proprietăților ei polivalente, ingestia de argilă își are, în aceeași măsură, rostul și în anemii, limfatisme, furunculoză, și asta deoarece ea curăță sângele și întreg organismul, neutralizează toxinele, aduce în mediul intern și celulelor anumite elemente indispensabile vitalității și capacității lor de apărare împotriva infecțiilor: siliciu, aluminiu, fier, calciu, sodiu, potasiu, magneziu.

Argila stimulează organele deficitare și – aidoma oligoelementelor ce se găsesc din plin în ea – pare să acționeze de multe ori și numai datorită faptului că este prezentă, neavând importanță în ce-cantitate este prezentă!

Are o influență evidentă asupra glandelor endocrine, putând să fie, deopotrivă, când excitantă când moderatoare a activității acestora, în funcție de dereglajele hormonale de care suferiți.

**CE BOLI POT FI TRATATE DE
*ÎNGERUL PĂMÂNTULUI***

ABCES (și: adenite, antrax, furuncul, panarițiu)

În urma unei infecții, în țesuturi sau chiar în organe poate apărea o „umflătură cu puroi“, situată într-o cavitate închisă. Puroiul este format din resturi de celule, microbi, globule albe care încearcă să distrugă microbii, uneori și sânge. Acesta este abcesul. El poate fi localizat la suprafață sau în profunzime, poate fi acut, subacut sau cronic, poate fi provocat de diferiți microbi. Indiferent de toate acestea, evoluția este aceeași: când s-a strâns suficient puroi, fie se sparge (dacă este sub piele), fie formează un canal (se fistulizează), iar puroiul este eliminat în exterior. După cât de rapid colectează, abcesul este „cald“ și „rece“. Pentru piele este caracteristic abcesul cald, iar locul unde s-a format este roșu, fierbinte, umflat și durerea este sub forma unui zvâcnet (pulsatilă). Există și abcese reci, superficiale, în care umflătura aproape nu se vede, nu doare, pielea de deasupra fiind subțire și albicioasă.

- **Cataplasme** groase, ținute cam o oră. Dacă aveți senzația că „vă este frig“, înlocuiți-o, mai repede de un ceas, cu alta nouă. Se pun patru până la șase cataplasme zilnic, ori, dacă utilizăm și alte remedii naturale, se alternează de două-trei ori argila cu celelalte tratamente.
- Alternativ, **cataplasme calde de ceapă coaptă**, care se țin și ele preț de o oră.
- Alternativ, **frunze de varză**.
- Alternativ, **comprese** înmuiate într-un amestec de esențe naturale aromatice.

Tratamentul se face timp de câteva zile, până când supurația dispare.

ABCES DENTAR

- **Cataplasme** cu argilă pe obraz, schimbate din două în două ore.
- **Consult stomatologic** obligatoriu.

ACNEE

Este o boală de piele, o erupție cutanată, ale cărei manifestări sunt cunoscute sub numele popular de „coșuri”. Cea mai des întâlnită și cea mai obișnuită este acneea juvenilă (acneea tinerilor, acneea vulgară). Apariția ei se datorează multor cauze. În primul rând, unor tulburări hormonale greu de corectat, destul de puțin cunoscute, care se restabilesc odată cu vârsta. La tinere, puseele de acnee mai apar și înaintea ciclului menstrual. La băieți este abundentă și persistentă în mai tot timpul pubertății. Dispare mai întotdeauna după treizeci de ani și, în mod sigur, odată cu prima sarcină, la femei. În al doilea rând, starea organelor de digestie joacă un rol important. Regimul alimentar trebuie corijat, mâncărurile grase (grăsimile animale, în general), condimentele iuți, dulciurile „grase” (ciocolata, cacao, cremele cu unt), alunele, cafeaua, alcoolurile tari fiind interzise. Se recomandă fructe, legume, salate, verdețuri, brânzeturi nefermentate, lapte, pâine integrală. Acneea se localizează mai ales pe față, dar se poate întinde și pe umeri, spate, piept. Ce sunt aceste „coșuri” – așa cum le spunem cu toții? Ele sunt niște leziuni dermatologice reprezentate prin comedoane (puncte negre), chisturi cornoase (aglomerări de celule din stratul cornos al pielii, dispuse concentric), papule (umflături roșiatice), pustule (bășicuțe cu lichid). Poate apărea sau predomina doar una

dintre ele, sau pot exista toate la un loc, depinde de forma de acnee. Pot fi în număr foarte mare, iar dacă este vorba de pustule, cicatricile lăsate sunt oribile.

- **Apă argiloasă** sau **noroi argilos** aplicat de două-trei ori săptămânal. Se lasă să se usuce timp de 20 de minute. Se spală apoi cu apă, ori cu apă de trandafiri, și se șterge fața cu suc de lămâie.
- Zilnic, dimineața, **argilă luată pe gură**.

ADENITE

Denumire generică pentru orice afecțiune a ganglionilor limfatici, caracterizată prin creșterea în volum a acestora.

Pentru tratament vezi ABCES.

AEROFAGIE

Înghițire de aer care se acumulează în stomac presând prin dilatația acestuia, pe diafragmă și inimă și cauzând dureri atât în abdomen, cât și în inimă; survine mai ales la fumători care înghit aer cu fum sau la băutorii de sifon. E mai mult un simptom decât o boală și survine mai ales la oamenii nervoși.

Pentru tratament vezi ULCER GASTRIC.

AFECTIUNI CARDIACE (de tipul: **inima slăbită, palpitații**)

Sunt boli ale inimii care produc o slăbiciune a acesteia, care se face simțită prin randamentul ei scăzut în actul de pompare a sângelui. Cauzele pot fi: hipertrofia mușchiului cardiac, hipertensiunea arterială, bronșitele cronice, tulbu-

răile de ritm cardiac și boli de metabolism (obezitate, astenie, diabet, carență de potasiu, alcoolism etc.). Când apare o slăbiciune a inimii fără a fi depistate modificări organice, cauza principală trebuie căutată în stress. O supra-solicitare cardiacă este sesizată prin simptome din cele mai diferite: greutate în respirație (dispnee) în timpul unor eforturi fizice, amețeli, puls crescut, fața și buzele se colorează spre albastru, zona gleznelor se umflă îndeosebi seara, senzații de urinare mai frecventă în timpul nopții, accese de tuse uscată.

- Înainte de toate, **consultați un cardiolog.**
- **Comprese cu apă argiloasă**, la 18⁰-20⁰ C, ținute, inițial, doar o jumătate de oră, apoi, cam după trei-patru zile, între una și două ore. Se pun pe regiunea inimii depășind ușor înspre dreapta și în jos regiunea cardiacă.
- **Cataplasme cu argilă**, subțiri – cam de 0,5 cm – și călduță. Se pun numai dacă veți suporta bine compresele și numai după ce ați pus acele comprese timp de opt-zece zile. Inițial cataplasmele vor fi ținute una-două ore. Dacă sunt bine tolerate se pot lăsa, după trei-patru zile, cam șase până la opt ore.

AFECTIUNI NERVOASE (de tipul: **convulsii, coree, epilepsie, nervozitate, paralizie, spasme, ticuri**)

- **Cataplasme cu argilă** pe ceafă, pe coloana vertebrală și în regiunea pelviană (partea de jos a abdomenului).
- **Fricții cu argilă** ale membrelor și ale coloanei vertebrale.
- **Argilă pe gură**: o linguriță într-o jumătate de pahar cu apă, zilnic, timp de 10-20 zile.

- **Consultația medicală necesară.**

ALBUMINURIE

Prezența a substanțelor proteice în urină, albuminuria renală se datorește unei boli de rinichi (nefrite), dar se întâlnește și în boli bacteriene sau virale (scarlatină, difterie, reumatism grav, gripă), când este însoțită și de febră; de asemenea apare în infecții, intoxicații. Albuminuria funcțională apare la sportivi, după supraefort și oboseală, precum și în boli digestive (supraalimentație proteică).

Pentru tratament vezi RINICHI.

ANEMIE

Boală produsă de scăderea numărului de globule roșii sau a încărcării lor cu hemoglobină. Ca urmare, scade cantitatea de oxigen pe care o transportă sângele la țesuturi și se produc tulburări generale (paliditate, slăbiciune generală, adinamie). Apare în urma unor hemoragii externe mari și interne (ulcere grave) sau în boli în care distrugerea (hemoliza) globulelor roșii este exagerată. Producerea globulelor roșii este deficitară în urma unei lipse de fier sau de vitamine (anemie pernicioasă) a organismului. Există și cazuri când anemia este urmarea unei funcții deficitare a măduvii hematogene.

Pentru tratament vezi OBOSEALĂ GENERALĂ.

ANGINĂ (și: laringită)

Inflamația acută a faringelui este rareori generalizată în

întreaga cavitate a acestuia și, de cele mai multe ori se localizează la nivelul amigdalelor.

Cauzele și consecințele anginelor. Fiind „un răspuns“, o reacție la „agresiunea“ unui germen patogen, fie el microb sau virus, angina se manifestă prin: dureri spontane, exagerate, la înghițire (disfagie) și un complex de semne (simptome) specifice unei stări infecțioase, semne ce diferă în funcție de tipul infecției și de vechimea ei. Dar mai presus de toate, ceea ce face să fie extrem de periculoase dacă sunt lăsate să evolueze în voie, este că anginele pot genera infecții de focar – nefrite, reumatisme, tulburări oculare – infecții generalizate – septicemii – și stări metastatice. Germenii cei mai des întâlniți în angine sunt streptococul hemolitic și virusurile.

Au fost diferențiate trei grupe mari de angine:

- Anginele roșii, sau așa-numitele angine fără exudat care pot fi:

- Angina roșie centrală, cea mai frecventă, fiind epidemică, contagioasă, datorată virusului gripal ori altor virusuri localizate în organe vecine faringelui, sau streptococului, stafilococului, pneumococului. Se manifestă prin febră mare, dureri de cap, greutate la înghițire. Amigdalele sunt roșii, ganglionii gâtului sunt măriți și dureroși la atingere. Cea mai frecventă complicație este nefrita streptococică și otitele.

- Anginele din bolile eruptive ale copilăriei, cum sunt rușea, scarlatina, rușea, constituie un semn major al acestor afecțiuni.

- Angina streptococică din reumatismul acut este un caz particular, fiind precedată de câteva zile în care există manifestări reumatice articulare ori suferințe cardiace, apoi

instalându-se o amigdalită generalizată, urâtă, cu vomă și dureri de cap.

- Anginele albe, cu un exudat sub formă de depozite grunjoase alburii ori ca false membrane.

- Angina difterică, produsă de bacilul difteric, membranele nu sunt false, sunt adevărate și aderente, groase și pot produce așa-numitul crup difteric (astuparea fundului gâtului, urmată de sufocare). Se tratează cu ser antidifteric.

- Anginele albe, eritemato-pultacee și pseudo-membranoase. Primele sunt asemănătoare cu cele roșii, dar pe amigdala umflată apare un depozit cremos, alb-cenușiu, ușor de îndepărtat prin ștergerea cu un tampon de vată. A doua categorie, pseudomembranoase, exudatul imită membranele, strâns lipite de amigdale și mucoase. Bolnavul are febră, dureri în gât, ganglionii cervicali și submaxilari măriți și dureroși.

- Angina herpetică. Boala începe brusc, prin frisoane, febră mare, dureri violente în gât, iar pe mucoasa faringiană și pe cea a obrazilor apar pete albicioase înconjurate de o zonă roșatică.

- Anginele ulcerose, în care pe mucoasa faringiană și/sau pe țesutul amigdalian apar ulceratii.

- Angina Vincent apariția unei ulceratii doar pe o singură amigdală.

- Angina Duguet apare o ulceratie ovalară pe unul sau pe ambii pilieri ai vălului palatin și este un semn de diagnostic pentru febra tifoidă.

- Anginele din bolile de sânge apar în mononucleoză infecțioasă, agranulocitoză, leucoză, leucemie.

- Angina Ludwig este datorată unui flegmon al gurii ce duce la deformarea gâtului, febră mare și dureri pulsatorii foarte violente.

- **Cataplasme cu argilă** la gât, de două-trei ori zilnic, ținute câte două ore.

- **Gargarisme cu apă sărată.**

- **Gargarisme cu apă argiloasă.**

- **Gargarisme cu apă cu lămâie.**

- **Gargarisme cu un decoct din frunze de turpă mare**

Toate gargarismele se amestecă într-un melanj de esențe aromatice naturale, diluat în apă caldă.

ANTRAX

Antraxul este o boală infecto-contagioasă provocată de pătrunderea în organism, pe cale cutanată, digestivă sau pulmonară, a sporilor de bacili antrax sau carbunoși. Forma cutanată (pustulă malignă) apare ca o crustă negricioasă înconjurată de vezicule (bubă neagră) la cei ce manipulează animale moarte de această boală (măcelari, veterinari, pielari). Consumul cărnii acestor animale produce forma intestinală a bolii, iar aspirația sporilor produce pneumonia carbunoasă (boala colectorilor de zdrențe).

Pentru tratament vezi ABCES.

ARSURI

Arsurile pot fi de soare sau prin atingerea de obiecte fierbinți ori opărirea cu apă clocotită. Și unele și celelalte se manifestă prin înroșirea pielii, usturimi puternice, formarea de bășici, zemuirea și spargerea lor, desfacerea pielii în fâșii-fâșii (cojirea, descuamarea, formarea de

lambouri). Durerea locală este mult mai mare atunci când te opărești sau te-frigi. În schimb, în cazul insolațiilor puternice, mâncărimile persistă mult timp după ce ne „cojim“. În ambele cazuri, dacă suprafața arsa este mare, starea generală este proastă, apar febră, dureri de cap, amețeală, vomă, dureri musculare, leșin. Expunerea excesivă la soare este dăunătoare, arsurile repetate de soare pot genera cancer de piele (melanom).

- **Cataplasme cu argilă**, groase, puse pe un tifon și nu direct pe arsură. Se lasă o oră. Dacă tifonul s-a lipit de piele, ȧesuturi, nu-l scoateȧi. Argila va păzi arsura de infecȧie, va elimina celulele moarte, va ajuta cicatrizarea. Schimbaȧi argila la fiecare două ore, și ziua și noaptea, fără să dezlipiȧi tifonul. Când pielea arsă s-a refăcut complet, tifonul se va desprinde de la sine.

De-acum se vor pune doar două sau trei cataplasme zilnic, care vor fi lăstate câte două ore. Apoi, una-două, până la cicatrizarea definitivă.

Cicatricea este, de cele mai multe ori, frumoasă, netedă, curată.

- **Băi cu noroi argilos** pentru arsurile de la mâini și de la picioare: se face un noroi gros, consistent, într-un lighean mic, cât să cuprindă labele picioarelor ori palmele; se ȧin mâinile și picioarele în el timp de o oră. Se repetă baia de două ori, zilnic. Între băi se fac pansamente cu tifon.

- **Se ung arsurile cu esenȧe aromatice speciale.**

- **Consult medical obligatoriu.**

ARTRITĂ DENTARĂ (și: puroi gingival)

- **Argilă** pe post de **pastă de dinți**, spălată cu **apă foarte sărată**: o lingură de sare marină la un pahar de apă.
- Cu aceeași **apă sărată** se vor face, zilnic, spălături bucale, menținând apa în gură timp de două-trei minute.
- Sugeți o **bucată de argilă** mică în timpul zilei și la culcare.

ASTENIE

Astenia este o stare subiectivă de oboseală intensă și prelungită, însoțită de epuizare, lipsă de tonus adecvat pentru o activitate susținută și, spre deosebire de oboseală, nu dispare după repaus. Se întâlnește în nevroze, depresii, convalescență, surmenaj.

Pentru tratament vezi **OBOSEALĂ GENERALĂ**.

ASTM (și: bronșite)

Astmul este un sindrom caracterizat prin crize de sufocări însoțite de tulburări ale circulației și secreției mucoaselor respiratorii. Criza de astm se declanșează de obicei noaptea, bolnavul fiind trezit de o senzație de jenă respiratorie care se accentuează rapid încât simte nevoia să se așeze în șezut. În câteva minute criza atinge apogeul, iar bolnavul, pradă unei cumplite nevoi de aer, acoperit de sudoare, îngrozit, încearcă din răputeri să respire. Întreaga respirație este șuierătoare, iar după o jumătate de oră, sau mai mult, apare un acces de tuse însoțită de o expectorație săracă, un scuipat cenușiu perlat cu alburii. Factorii declanșatori sunt foarte diverși: alergici, psiho-afectivi, alimentari, respiratori, endocrinieni.

- **Cataplasme calde cu argilă** puse pe piept și pe spate. Se schimbă de două ori și se țin între două și patru ore fiecare.

- **Inhalații de esențe aromatice naturale.**

BLEFARITE

Inflamația pleoapelor produsă de diferite infecții microbiene, virale, micotice sau parazitare, ca și în urma acțiunii unor agenți fizici sau chimici. Extensiunea inflamației la conjunctive produce blefaroconjunctivita.

Pentru tratament vezi **OCHI**.

BĂTRÂNEȚE

Bătrânețea sau senescența este epoca terminală a vieții omului, proces biologic inevitabil, a cărui apariție, progresie și intensitate sunt în funcție de mulți factori, interni și externi. Longevitatea depinde în primul rând de factorii ereditari, familiali, rasiali, însă într-o măsură mai mică și de factorii externi, de ocupație, alimentație, toxiinfecție, traume fizice și psihice.

Pentru tratament vezi **OBOSEALĂ GENERALĂ**.

BRONȘITE

Bronșita acută este inflamația bronhiilor, mucoasa fiind totdeauna cea afectată, rareori și celelalte straturi ale peretelui bronhial. Ea poate surveni după o iritare cu pulberi sau gaze toxice, în urma unor boli infecțioase situate la nivelul bronhiilor (gripă, rujeolă, tuse convulsivă), sau după o răceală zdravănă.

Frecvența și gravitatea bronșitei cronice au rămas mult timp insuficient cunoscute, semnele afecțiunii sunt banale, iar examenul radiologic nu arată vreo leziune. În evoluția sa, mult timp boala nu se manifestă decât prin tuse cu expectorație. Dar, din păcate, mai toți bronșiticii cronici fac, în final, o insuficiență respiratorie severă însoțită de un emfizem pulmonar, maladia transformându-se într-o bronhopneumopatie cronică.

Pentru tratament vezi ASTM.

CIROZĂ

Boală cronică a ficatului, caracterizată prin degenerarea grasă a țesutului hepatic și înlocuirea lui cu țesut conjunctiv, ceea ce duce la scăderea în volum, deformarea și îndurația organului. Este urmarea inflamațiilor hepatice, în special de natură infecțioasă, tratate insuficient sau incorect (hepatită epidemică, sifilis, malarie), a abuzului de alcool, intoxicațiilor cu arsen sau fosfor, sau a unor tulburări circulatorii cronice (insuficiență cardiocirculatorie).

Pentru tratament vezi FICAT.

CISTITĂ

Inflamația vezicii urinare, produsă de propagarea unei infecții ascendente sau descendente pe uretră sau ureter, sau de stagnarea urinei ori datorită eliminării prin urină a unor microbi sau substanțe toxice. Evoluează acut sau cronic cu dureri în hipogastru și micțiuni frecvente. Examenul urinei furnizează informații prețioase asupra cauzelor și naturii bolii.

Pentru tratament vezi VEZICĂ URINARĂ.

COLICI HEPATICE

Dureri violente abdominale ce apar brusc sub formă de crize provocate de infecția vezicii biliare, sau calculoză biliară.

Pentru tratament vezi FICAT.

COLICI NEFRITICE

Este o maladie din ce în ce mai frecventă, în ultimii ani, la bărbați. Se manifestă printr-un sindrom dureros acut, foarte puternic, localizat în zona lombară și cu iradiere spre plica inghinală. Criza este însoțită de stare de rău general, grețuri, vomă, tulburări de micțiune (urinare), frisoane. Cel mai adesea simptomele indică existența unei litiaze renale, calculii renali putând fi: oxalați, fosfați sau sulfați de calciu. Natura chimică diferită a pietrelor este legată în mod direct de „obiceiurile” alimentare și anume: oxalații se formează la un consum exagerat de cafea, cacao, spanac, tomate etc. Consultul medical este necesar mai ales că durerile sunt foarte puternice.

Pentru tratament vezi RINICHI.

COLITE

Sunt inflamații ale colonului (intestinul gros) asociate uneori cu cele ale intestinului subțire (enterocolite). O colită se manifestă cu diaree, puroi și sânge în scaun, fecale lichide, nevoie permanentă și dureroasă de-a defeca, dureri abdominale difuze. Febra poate sau nu să existe. Cauzele declanșării colitelor sunt: infecțioase bacteriene (colita și

rectocolita dizenterică), toxiinfecțioase alimentare, toxice (enterocolita mercurică), parazitare, autoimunitare (rectocolita hemoragică), virotice.

Pentru tratament vezi **CONSTIPAȚIE**.

CONJUNCTIVITĂ

Inflamația acută sau cronică a conjunctivei produsă de diferiți agenți iritanți fizici sau chimici și de infecții microbiene. Conjunctivita de primăvară se datorește sensibilității la polen, conjunctivita purulentă este produsă de infecția cu diferiți germeni piogeni; la copilul nou-născut poate fi de natură gonococică. Deosebit de gravă este conjunctivita granuloasă sau trahomul.

Pentru tratament vezi **OCHI**.

CONSTIPAȚIE (și: colite, diaree, dizenterie, enterită)

Constipația este starea patologică în care conținutul intestinal „stă”, rămâne mult timp, în colon și în rect. Cauzele sunt variate: constipația mecanică se produce în urma stenozei intestinale, de natură cicatricială, tumorală; constipația alimentară, din cauza unei alimentații prea sărace în resturi nedigerabile; constipația dischinetică e provocată de tulburarea aparatului nervos din peretele intestinal, fiind în legătură cu starea sistemului nervos vegetativ și central. Simptomele generale ale constipației sunt dureri de cap, stări depresive, gust rău și miros urât în gură, limba acoperită, saburală.

- **Cataplasme cu argilă, reci**, pe abdomen. Se pun de două ori pe zi, câte două-trei ore, și, dacă e nevoie una se poate lăsa toată noaptea.

- **Argilă pe cale bucală**: se pune o linguriță de argilă în jumătate de pahar cu apă, și se bea zilnic, timp de 10 până la 20 de zile.

ATENȚIE: în caz că nu se remarcă o ameliorare rapidă a constipației, se oprește imediat tratamentul cu argilă.

CONTUZII (și: lovituri, vânătăi)

Leziune tisulară provocată de o acțiune mecanică (lovire), care nu duce decât la o compresie a țesuturilor fără rupturi externe; când contuzia este ușoară se produce o hemoragie capilară subtegumentară, care dă o pată ce se înălbăstrește, apoi devine brună, verzui-gălbui și apoi dispăre (se produce mai ales la femei cu țesuturile dermice delicate). Când contuzia este gravă, sângele ce invadează țesuturile dermice și subacente poate să se infecteze și să ducă la gangrene.

- **Cataplasme cu argilă, reci**, lăsate să acționeze timp de două ore. Se schimbă cât mai des pe parcursul zilei.
- **Compresă cu apă argilăoasă** ținută toată noaptea.
- **Paralel, aplicații de frunze de varză**.

CONVULSII

Contracția repetată, involuntară, a unui grup muscular sau a musculaturii întregului organism. Convulsii clonice: scurte, ritmice, localizate de obicei la un grup muscular. Convulsii tonicoclonice: alternarea contracțiilor scurte,

ritmice, cu contracții de durată mai lungă. Convulsii apar și în epilepsie, eclampsie, isterie etc.

Pentru tratament vezi AFECȚIUNI NERVOASE.

COREE

Sindrom neurologic, caracterizat prin prezența unor mișcări involuntare, aritmice, dezordonate și fără finalitate. Coreele pot fi: Sydenham – la copii, Huntington – la adulți; gravidică, senilă. Se recomandă odihnă totală și regim.

Pentru tratament vezi AFECȚIUNI NERVOASE.

CORIZĂ

Coriză (guturai, rinită acută, banală), inflamație acută catarală a mucoasei nazale; provocată de frig și umezeală; infecția propriu-zisă este produsă de viruși în asociație cu diferiți germeni banali. Este o boală banală, ușoară, ce constă în scurgerea nazală, la început seroasă, apoi mucopurulentă, iar la sfârșit purulentă, însoțită de cefalee, subfebrilitate și ușoară alterare a stării generale. O formă specială de coriză este cea sifilitică, care este o manifestare a sifilisului nou-născutului.

Pentru tratament vezi SINUZITE.

DEMINERALIZARE

Pierderea unor cantități însemnate de săruri, fenomen ce se observă în anumite tulburări de nutriție (pierderea de cloruri prin sudoare, fosfați, carbonați de calciu prin urină și fecale); ca urmare se produce decalcifierea oaselor și pot apărea fracturi frecvente; indivizii slăbesc căci întregul metabolism e deranjat prin lipsa ionilor minerali, care nu se

mai găsesc în cantitatea necesară în sânge, în țesuturi, în celule și, prin lipsa lor, desfășurarea normală a metabolismului este tulburată.

Pentru tratament vezi OBOSEALĂ GENERALĂ.

DERMATOZE (de tipul: eczeme, impetigo)

Sunt maladii ale tegumentelor, afecțiuni cutanate neinflamatorii.

- **Argilă pe gură**, în fiecare dimineață.
- **Tratamente fitoterapeutice** adecvate.
- **Badijonări locale cu argilă**. Se fac o dată sau de două ori pe zi și se lasă argila, timp de 20 de minute, să se usuce bine. Se spală.

DIAREE

Eliminarea prea rapidă a unor scaune prea lichide sunt caracteristice deosebesc diareea propriu-zisă de falsa diare, datorată doar unui surplus de secreție și prezentă la persoanele ce suferă de constipație.

Diareea acută poate fi moderată sau intensă, luând uneori un aspect dizenteric, prin frecvența și felul în care arată scaunele. Cauzele sunt multiple.

Diareea cronică poate apărea în afecțiuni gastrice, ale intestinului subțire, ale intestinului gros, poate avea origine pancreatică, toxică, uremică, hipertiroidiană, nervoasă etc. La copiii din prima copilărie (unu-trei ani), diareele pot fi foarte periculoase, provocând o deshidratare acută, mai ales dacă este ținută și o dietă. Un sugar cu diaree trebuie să-și primească, obligatoriu, rația lui de lichide, zilnică, sub formă de apă. La copii pot surveni unele din următoarele

diarei: asociate cu toate bolile copilăriei (rinofaringită, otită, rujeolă, eczemă etc.), care dispar odată cu boala, alimentare, datorate erorilor de alimentație, infecțioase generate de afluența unor germeni și microbi patogeni în intestin, care secretă toxine periculoase, modifică flora intestinală și fac imposibile digestia și absorbția. Ultima formă de diaree, cu scaune total lichide și foarte fetide (urât mirositoare), duce la deshidratare și slăbire, impresionantă, și se poate corija greu prin alimentație, fiind însoțită întotdeauna de vomă.

Pentru tratament vezi CONSTIPAȚIE.

DIZENTERIE

Boală infecțioasă caracterizată prin dureri abdominale, tenesme (senzație dureroasă de a avea scaun) și numeroase scaube mucosanghinolente. După agentul cauzal există două forme de dizenterie: cea bacilară, produsă de bacilul dizenteric care este foarte frecvent în regiunile temperate; și cea amibiană, produsă de protozoarul *Entamoeba disenteriae* sau *histolitica*.

Pentru tratament vezi CONSTIPAȚIE.

DURERI REUMATISMALE (și: gută, nevralgii)

• Cataplasme cu argilă:

- reci ori călduțe, în caz de crize acute;
- calde, în stările cronice, zilnic, de câte două-patru ore, sau se pune o cataplasma seara și se ține toată noaptea.

În tratamentul de întreținere se pune doar o cataplasma pe zi.

ECZEME

Sunt cele mai frecvente dermatoze, reprezentând o cincime din bolile de piele. În majoritatea cazurilor se pare că sunt ereditare, se vindecă greu și reapar, de cele mai multe ori, după încetarea tratamentului. Pe piele apar macule, papule, vezicule, cruste, coji. În stadiul acut, zona afectată e umflată, roșie, zemuindă; în stadiul subacut, pielea pare congestionată și se cojește (se descuamează); când s-a cronicizat, aspectul ei este de strat înroșit, dur, îngroșat, brăzdat de striuri. Are foarte multe forme: atopică, de contact, micozică, microbiană, seboreică, varicoasă, a mamelonului, vulvară, nevrodermită. Eczema atopică, caracteristică sugarului, care apare pe față și la pliuri, invadând progresiv, pielea cu păr și chiar întregul corp, trebuie tratată foarte bine ca să nu reapară, în timpul vieții, la oboseală, menstrre, pubertate, sarcină, menopauză, andropauză se combină chiar cu un astm, ceea ce este cel mai grav.

Pentru tratament vezi DERMATOZE.

ENTERITE

Inflamație a mucoasei intestinului subțire, uneori asociată celei a stomacului (gastroenterită) sau a colonului (enterocolită). Majoritatea celor acute se datorează infecțiilor cu microbi, ce pătrund odată cu alimentele, dar și ca urmare a intoxicațiilor provocate de componentele alimentare ce putrezesc în intestinul gros. De multe ori enteritelor li se adaugă și infecții virale foarte ușoare. Alteori enteritele apar în cadrul unor boli infecțioase de sine-stătătoare.

Pentru tratament vezi CONSTIPAȚE.

EPILEPSIE

Boală caracterizată „prin episoade paroxistice, datorate unor descărcări hipersincrone de populații neuronale“. Ritmul de apariție ca și forma de desfășurare a crizelor este particulară de la bolnav la bolnav. Crizele sunt precedate de un anumit simptom, numit aură, care este mereu același pentru un anumit bolnav, încât familia poate fi avertizată pentru a lua măsurile necesare.

Pentru tratament vezi AFECȚIUNI NERVOASE.

FICAT ȘI VEZICULĂ BILIARĂ BOLNAVE (de tipul: ciroză, colici hepatice, icter, tumori)

Cea mai mare glandă a corpului, ficatul este situat sub diafragmă, în partea dreaptă a cavității abdominale; la adult are 1,5-2 kg greutate. Este învelit într-o capsulă fibroasă și este fixat cu mai multe ligamente hepatice care-l leagă de peritoneu. Are o culoare roșie-violacee-brună și o consistență fermă, dar prin lovire poate fi rupt. La om este alcătuit din patru lobi (unul drept și altul stâng, mai mari, unul pătrat și altul Spiegel, mai mici și dispuși între primii). Circulația sanguină a ficatului este foarte complexă. Primește sânge prin artera hepatică (din aortă) și prin vena portă (de la întregul aparat digestiv); din ficat se colectează sânge prin vena suprahepatică, care se varsă în vena cavă inferioară. Ficatul este sediul multor boli, provocate mai ales de supraîncărcare alimentară, dar uneori și de infecții virotice și bacteriene. Semne ale unor tulburări hepatice, ca: balonare, dureri surde, diaree,

dermatoze diferite, insomnii, astenii etc., se suprapun și altor boli din acest motiv la orice tulburare trebuie chemat medicul.

Vezica biliară, rezervorul bilei în perioadele dintre două mese (digestii), are forma unei pere și face parte din căile biliare extrahepatice accesorii. Este lipită de fața inferioară a ficatului și se continuă prin canalul cistic, care întâlnește canalul hepatic. Sucul biliar este secretat de niște celule hepatice dispuse câte două, față în față, în cordoane, în centrul cărora există un canal care se deschide în partea inferioară a cordoanelor, formând o rețea de vase fine (căile biliare intrahepatice), care confluează în canalul hepatic. Acesta se unește cu canalul cistic al veziculei biliare, formând canalul coledoc sau hepatocolodoc, ce se deschide în pancreas. Canalul hepatic și continuarea sa, canalul hepatocolodoc (sau, pe scurt, coledoc) formează calea biliară extrahepatică principală. La joncțiunea cu cisticul, bila poate trece fie spre veziculă, și se acumulează acolo, fie spre coledoc, atunci când alimentele au fost prelucrate în stomac și trec în duoden. Vezicula biliară și canalul cistic alcătuiesc căile biliare extrahepatice accesorii. Acest sistem este neapărat necesar întrucât ficatul produce lichidul în mod continuu. Rezerva aflată în vezicula biliară se varsă în duoden când acolo au ajuns alimentele. Lichidul biliar este util pentru valorificarea vitaminelor și a grăsimilor. El suferă modificări: prin absorbția de apă se concentrează îmbogățindu-se în colesterol care, în cazuri patologice poate precipita, transformându-se în calculi biliari.

- Cataplasme cu argilă, reci:

– *subțiri* și lăsate să stea în regiunea hepatică două ore dacă nu apare senzația de răcire, de rău, de durere;

– *groase*, de 2 cm, la câteva zile după ce s-au aplicat cele subțiri și ele au fost bine suportate;

• **Cataplasma cu argilă**, călduță ori caldă, dacă nu au fost tolerate cele reci. Dacă se pune seara poate fi ținută toată noaptea, în caz că nu provoacă nici un fel de tulburări.

FOLICULITĂ INTRANAZALĂ (și: furunculoză intranzală)

Inflamația purulentă produsă de streptococ.

• **Consultație medicală** prealabilă, obligatorie.

• **Bombițe de argilă** introduse în nări. Se lasă o oră, se scot, se bagă altele. Se repetă procedura toată ziua.

ATENȚIE: trebuie făcut tratamentul cu grijă să nu se spargă sau rupe foliculul sau furunculul, răspândirea puroiului fiind foarte periculoasă la acest nivel. Tratamentul poate fi făcut numai cu acordul medicului.

Pentru tratament vezi ABCES, FURUNCUL.

FURUNCULE

Furunculul este un coș mare, de fapt un abces dureros, care progresiv, se înroșește, începe să frigă, pielea din centru se subțiază, se observă dedesubt puroiul, pielea din jur e infiltrată și doare. În câteva zile se poate sparge singur. Apar, de obicei, ca urmare a unor infecții locale cu stafilococ, zona de predilecție fiind la ceafă, pe fese și la subsuoară, la baza unui fir de păr. Dar pot apărea oriunde, pot fi solitare sau grupate (furuncul antracoid, antrax).

Localizate pe față, în nas, aproape de ochi, pot avea o evoluție foarte periculoasă. În marea lor majoritate sunt datorate lipsei de igienă, dar o furunculoză (pusee repetate de apariție a mai multor furuncule, unul după altul) poate fi datorată scăderii capacității de autoapărare (imunitate înăscută, naturală) a organismului, deprecierii calității sângelui, regimului alimentar irațional, dezechilibrat.

Pentru tratament vezi ABCES.

GANGRENĂ

Gangrena este moartea unei porțiuni a organismului care are contact cu mediul extern. Interesează în special extremitățile (degete, nas, urechi, mână, picior). Porțiunea necrozată este sensibilă și dureroasă, de culoare violacee-neagră; ea se poate usca (gangrenă uscată sau mumificare) sau infecta cu producere de puroi (gangrenă umedă sau putridă). Gangrenele pot fi eliminate sub formă de sfacel, escară etc. Când necroza este produsă de infecția unei plăgi cu microbi anaerobi, ducând la putrefacția țesuturilor și la apariția de gaze urât mirositoare, gangrena este gazoasă. Poate fi provocată de leziuni traumatiche grave (război), arsuri, raze X (doze mari).

Pentru tratament vezi RĂNI INFECTATE.

GASTRITĂ

Inflamație a mucoasei gastrice ce poate fi acută sau cronică. Gastritele acute sunt rareori izolate, ca boli de sine-stătătoare, ele fiind însoțite, aproape întotdeauna, de o afectare a intestinului subțire (gastroenterită) sau, simultan, a intestinelor gros și subțire (gastroenterocolită).

O inflamație acută a mucoasei stomacului apare numai după mese copioase, după mâncări greu digerabile, consumul de băuturi reci, excesul de alcool, nicotină sau medicamente, ca și după consumul de alimente alterate. Se manifestă prin eructații dese, stare de rău, lipsă de poftă de mâncare și dureri în zona stomacului, ce pot apărea și sub formă de crampe. Accidental există și diaree și febră ușoară. Un regim alimentar ușor, care va oferi stomacului un răgaz de câteva zile, precum și renunțarea în totalitate la fumat și băuturi alcoolice au un efect beneficător. Este bine ca regimul să fie asociat cu utilizarea ceaiurilor de plante.

Gastritele cronice apar, în special, când mesele se iau la ore neregulate, când se mănâncă repede și hulpav, alimentele sunt insuficient mestecate în gură, prin exces continuu de alcool și nicotină, din cauza unor lipse acute de vitamine, în cadrul tulburărilor în producerea sucului gastric.

Pentru tratament vezi ULCER GASTRIC.

GUTĂ

Gută (podagră), boală datorată tulburării metabolismului nucleoproteinelor, caracterizată prin creșterea acidului uric în sânge și depunerea sărurilor sale (urați) în țesutul cartilagos, în special la nivelul articulațiilor mici ale mâinii și piciorului. Aceste depozite de urați duc la apariția de mici noduli de consistență dură (tofi gutoși), care sunt originea crizelor deosebit de dureroase de gută. Nu se cunoaște cauza bolii, dar pare a fi legată de o viață sedentară și excesul de alimente din carne.

Pentru tratament vezi DUREI REUMATISMALE.

HEMOROIZI

Hemoroizii sunt varicozități sau dilatații ale venelor plexului venos perianal. Afecțiune frecventă la oamenii vârstnici. Cauzele sunt sedentarismul, constipația, predispoziții familiale. De multe ori apar cu varice ale membrului inferior, cu varicocel (varice testicular) sau cu picior plat, ca semn al elasticității scăzute, fie al prerenalilor venoși, fie al țesutului conjunctiv, în general. Prezența hemoroizilor sub formă de noduli moi, violacei, în jurul orificiului anal, nu produce simptome supărătoare, decât în cazul complicațiilor. Hemoroizii pot fi externi, în afara orificiului anal și interni, în interiorul anusului. Complicațiile sunt: tromboflebita nodozităților (inflamația și coagularea sângelui) și sângerarea. Tratamentul preventiv al complicațiilor este: scaune moi și regulate, zilnice, și igiena severă a zonei anale.

- **Cataplasme cu argilă**, reci, mici, lăsate una sau două ore, în regiunea anală.
- Alternativ, **aplicații de foi de varză**, în aceeași regiune
- **Tratament general**, obligatoriu.

ICTER

Icterul (gălbenare) este colorația gălbuie a pielii și mucoaselor datorită impregnării cu pigment biliar (bilirubină), bila neputându-se scurge în duoden și revărsându-se în sânge. După condițiile de apariție, există trei categorii principale de icter: 1) icter hepatic datorat unor leziuni ale ficatului produse de infecții (icterul epidemic, febra galbenă, leptospiroza icterohemoragică, sifilis, alcool) sau de procese tumorale (cancer hepatic sau

metastaze hepatice ale altor tumori); 2) icter mecanic produs de închiderea căilor biliare, de calculi, cancerul capului pancreasului care comprimă canalul coledoc, mai rar datorat unor procese inflamatorii, parazitare; 3) icter hemolitic apărut în urma unui proces de hemoliză crescută în organism, așa cum se întâmplă în anemiile hemolitice, prin rezistență globulară scăzută sau prin anticorpi hemolitici (autoanticorpi, anticorpi materni contra hematiilor de făt, transfuzii de sânge incompatibil).

Pentru tratament vezi FICAT.

IMPETIGO

Impetigo (pecingine) este o boală a pielii produsă, de obicei de streptococ sau stafilococ și caracterizată prin apariția de bășicuțe cu conținut purulent care se ulcerează și se acoperă de cruste. Boala se întâlnește în special la copii.

Pentru tratament vezi DERMATOZE.

INIMA BOLNAVĂ

Organ musculos, motor al aparatului circulator, situat în regiunea mediană a toracelui, între cei doi plămâni inima este ca o pompă aspiro-respingătoare și lucrează cu atriile drept și stâng, care împing sângele în ventriculii drept și stâng (ventriculul drept împinge sângele în circuitul pulmonar – mica circulație, ventriculul stâng în restul corpului – marea circulație). Are forma unui con întors cu vârful în jos, acesta fiind îndreptat puțin spre stânga. Greutatea inimii variază între 250-300 g, iar volumul, între 50-70 cm. Este alcătuită din trei straturi din exterior spre

interior: pericard, endocard și miocard, iar în interior sunt cele două atriile situate la baza cordului și cele două ventricule înspre vârf. Inima este împărțită în două jumătăți: dreaptă și stângă, printr-un perete longitudinal, dar ventriculul și atriul stâng, ca și ventriculul și atriul drept, fiind separate de pereți transversali incompleți, pot comunica între ele. În masa musculaturii cardiace există un țesut special, de tip embrionar, numit țesut nodal, care, prin producerea impulsurilor ritmice, asigură contracțiile autonome ale inimii. Contracțiile inimii au o succesiune ritmică perfect coordonată: se contractă atriile, sângele este trimis în ventriculi care, în acest moment, erau în stare de repaus, în diastolă. Când ventriculii s-au umplut complet cu sânge încep să se contracte, intrând în așa-numita sistolă ventriculară. Sângele este împins și în artera pulmonară și în aortă. Bătăile inimii sunt date de închiderea orificiilor valvulare. Vasele inimii sunt arterele și venele coronare și venele lui Thebesius.

Când circuitul inimii funcționează bine, organismul uman este sănătos și puternic, organele individuale sunt bine asigurate cu sânge și substanțe nutritive în cazul metabolismului celular. În caz contrar, bolile vasculare, tulburările circulatorii, scurtează durata de viață, conduc la o îmbătrânire a țesuturilor înainte de vreme, pun viața în pericol.

Pentru tratament vezi AFECȚIUNI CARDIACE.

INSOLAȚIE

Boală produsă de acțiunea razelor soarelui asupra corpului sau capului; după expunere îndelungată, starea

generală este rea, caracterizată prin dureri de cap, grețuri, vărsături, temperatură ridicată, tahicardie, dispnee. Starea bolnavului se poate agrava, își poate pierde cunoștința și – fără ajutor – poate muri.

- **Cataplasme cu argilă**, reci, puse pe ceafă și lăsate să stea preț de un ceas. Se schimbă cât de des posibil în decursul zilei. Tratamentul se face câteva zile.
- **Cataplasme cu argilă puse în zona pelviană**, de două ori pe zi, timp de câte două ore fiecare. Se pun simultan cu cele de pe ceafă și tratamentul continuă tot câteva zile.

LARINGITĂ

Laringita acută este o inflamație acută a mucoasei laringelui, datorată prafului, fumului, tutunului, aerului rece, rinitei, sinuzitei, adenoiditei, unui surmenaj vocal, unor cauze generale cum ar fi intoxicațiile, infecțiile ș.a. Simptomele sunt alterarea vocii (disfonie), chiar dispariția ei (afonie), tusea seacă, aspră, lătrătoare. La inflamația laringelui (catar) pot să apară răgușeala și febra.

Laringita cronică este o cronicizare a unei din formele acute de laringită, datorită faptului că bolnavul se expune în continuare factorilor declanșatori: vapori și gaze toxice, tutun și alcool în exces, surmenaj vocal susținut, infecții repetate, diabet, gută, uremie, albuminurie etc.

Se întâlnesc mai multe forme clinice: catarul laringian cronic, laringita cronică hiperplazică, laringita cronică hiperplazică și ulcerosă, laringita cronică atrofică.

Simptomul general al tuturor formelor este distrofia (răgușeala), variabilă în intensitate. Corzile vocale pot fi roșii, umflate, îngroșate, ulcerate, cu noduli, cu excrescențe

mucoase, în funcție de tipul de laringită cronică. Mucoasa laringiană poate fi și ea roșie, albicioasă, scorțoasă, mult îngroșată în anumite regiuni ale laringelui.

Pentru tratament vezi **ANGINĂ**

LIMFATISM

Înflamație a ganglionilor limfatici care fie însoțește, de obicei, inflamația organelor învecinate, fie este expresia unei boli generale a organismului. Sunt interesați, în special ganglionii limfatici cervicali, axilari sau inghinali, care apar măriți ca volum, de dimensiunile unor alune sau nuci, de obicei sensibili având consistență pulpoasă sau semidură, mai ales în infecții acute (abces dentar, amigdalită, abcese, flegmoane). În unele boli grave există tendința de supurație și fistulizare (limfogranulomatoză veneriană, tularemie, actinomicoză, tuberculoză).

Pentru tratament vezi **OBOSEALĂ GENERALĂ**.

LITIAZĂ

Litiaza sau pietrele la rinichi se formează mai ales din săruri ce provin dintr-un consum exagerat de plante și de carne (oxalați, urați, fosfați și carbonați); se pun în evidență radiologic; se tratează preventiv cu dietă, dar mai ales prin operație.

Pentru tratament vezi **RINICHI**.

LOVITURI

Pentru tratament vezi **CONTUZII**.

LUMBAGO

Durere intensivă, localizată la nivelul regiunii lombosacrale, ce este provocată de umezeală, frig, curent de aer sau de efort fizic prelungit (lumbago primar). Poate fi datorat și îmbolnăvirii organelor vecine, coloana vertebrală, articulația sacro-iliacă, rinichi, prostata la bărbați, organele genitale la femei (lumbago secundar). În toate cazurile examenul medical este obligatoriu.

- **Cataplasme cu argilă**, călduțe ori calde. Se pun una sau două, pe zi, și se lasă fiecare două până la patru ore. Dacă nu apar tulburări, se poate aplica una seara și se lasă toată noaptea.

METRITE (și: salpingite)

Inflamația uterului, care poate fi localizată în: partea vaginală, în cervix, endometru, în musculatura uterină. Inflamația colului asociază de obicei colpita (inflamația vaginului). Endocervicita și endometrita se produc de multe ori în legătură cu o naștere sau avort, sunt procese acute, cu simptome de pierdere de sânge sau secreție de puroi, durere, febră. Infecția gonococică se recunoaște printr-o secreție purulentă, galben-verzuie. Endometrita acută se poate vindeca prin descuamația mucoasei uterine, cu ocazia menstruației; ea se cronicizează numai dacă este propagată și asupra stratului muscular; uterul metritic este mărit, dur, sensibil, de multe ori retroflectat din cauza greutateii.

- **Instilații vaginale cu apă argiloasă**, zilnic. Se pun două lingurițe de argilă la un litru de apă caldă.
- **Consultație ginecologică** prealabilă.

MIGRENE

Boală foarte răspândită, are la origine cauze multiple, motivul producerii ei nefiind precizat nici în prezent cu claritate. Tratatul de medicină o definesc drept un „sindrom caracterizat prin dureri semicraniene (localizate doar pe o jumătate a capului), paroxistice (de scurtă durată, ca niște accese, dar de intensitate maximă), însoțite de vomă și tulburări de vedere“. Accesele dureroase se datorează unor tulburări vasculare la nivelul capului. Vasul sanguin (o arteră cerebrală) se contractă brusc, sângele nu mai poate trece, fluxul sanguin se încetinește; cantitatea de sânge care stagnează apasă pereții vasului în porțiunea ce precede zona contractată, îi întinde din ce în ce mai mult, iar această dilatare forțată irită și inflamează vasul în cauză, generând durerea. Când este vorba de artere ce hrănesc creierul, senzația de durere este percepută sub formă de pulsații ritmice, senzație tipică migrenelor.

Sunt și situații mai rare, când migrena este bilaterală, când ea iriază pe zone mai restrânse, numai pe frunte și ușor spre tâmplă.

Durerile, prin intensitatea lor, pot deveni insuportabile, fiind percepute în ochi, în spatele acestora, în interiorul capului, dar niciodată în pielea capului. De multe ori, crizele de migrene sunt însoțite de grețuri, stare generală proastă și vărsături. Bolnavul se liniștește dacă se așază în pat, la întuneric și într-un loc liniștit. Uneori, apariția vărsăturilor duce la o eliberare și atunci criza încetează. Poate apărea, mai rar, și diareea.

- **Cataplasme cu argilă** puse, alternativ, pe frunte și pe ceafă:

- *argilă rece* pe frunte, lăsată o oră;
- *argilă caldă* sau *călduță* sau *caldă*, pe ceafă, lăsată două ore;
- **Băi calde** la picioare.

MUȘCĂTURI

Rană făcută în piele de aparatul bucal al unor animale (câini, lup, cal, chiar om); sunt foarte periculoase, dacă animalul e turbat, dacă în rană a rămas un dinte al animalului sau microbi; pot da tetanos și infecții.

Pentru tratament vezi RĂNI.

NECROZE

Moartea unei porțiuni din țesut sau organ în organismul viu, care reacționează izolând, lichefiind, resorbind și înlocuind porțiunea mortificată cu țesut conjunctiv. Cauza este suprimarea circulației arteriale prin compresiunea exterioară a arterei, îngroșarea peretului ei sau obliterarea sa printr-un chiag. Poate apărea în inimă, rinichi, ficat, creier și alte organe. La nivelul organelor, în contact cu mediul extern, porțiunea necrozată se numește infarct. La nivelul organelor externe ia aspectul unei gangrene.

Pentru tratament vezi RĂNI INFECTATE.

NERVOZITATE

Stare caracterizată prin pierderea liniștii și instalarea unei stări crescute de iritabilitate, intoleranță și nerăbdare. Apare în situații de alertă, la emoții intense, la toxicomani.

Pentru tratament vezi AFECȚIUNI NERVOASE.

NEURASTENIE

Nevroza cea mai răspândită în prezent, care se manifestă prin: neliniște, oboseală precoce, insomnie, cefalee și tulburări neurovegetative. Debutul lung și insidios este urmat de o perioadă de stare în care preponderența simptomelor se schimbă. Bolnavul se află într-o permanentă preocupare tensională, în direcția amplificării și analizării tulburărilor pe care le prezintă.

Pentru tratament vezi OBOSEALĂ GENERALĂ.

NEVI

Numiți popular alunițe, ei sunt neoformații benigne, bine delimitate, prezente de la naștere sau apărute spontan, ulterior. Se datorează dezvoltări, ori în exces, ori în minus, a uneia dintre componentele normale ale pielii: celulele pigmentare, stratul cornos, anexele pielii, vasele de sânge, glandele sebacee.

Pentru tratament vezi VERUCI.

NEURALGII

Sindrom dureros localizat pe traseul unui nerv al cărui nume îl poartă (nevralgie facială, intercostală, trigeminală, sciatică etc.). De exemplu, sciatica este produsă de lezarea nervului sciatic și se manifestă cu dureri, parestezii și contracturi apărute de-a lungul traseului acestui nerv. Cauzele sciaticii pot fi hernia de disc, traumatismul, tumoarea medulară.

Pentru tratament vezi DURERI REUMATISMALE.

NEVROZE

Boli psihice care apar datorită suprasolicitării, caracterizate prin astenie, cefalee, tulburări de somn, tulburări neurovegetative, anxietate, iritabilitate etc. În general, aprecierea critică a suferinței este supradimensionată, bolnavul fiind alarmat peste măsură de tulburările ce le trăiește. Cele mai cunoscute forme sunt: neurastenia, isteria, neuroastenia obsesivo-fobică, anxioasă, logoneuroza, crampa scriitorilor etc.

- **Argilă pe gură:** o linguriță de argilă într-un pahar de apă caldă. Se bea zilnic, timp de 10 până la 20 de zile.

- **Cataplasme cu argilă:**

- pe ceafă, de trei-patru ori pe zi, lăsate câte una-două ore;

- între ele, alternativ, se pun: **frunze de varză**, pe partea inferioară a abdomenului, coloana vertebrală.

OBOSEALĂ GENERALĂ (apărută în: anemie, bătrânețe, demineralizare, limfatism, neurastenie, rahitism)

Stare trecătoare de epuizare musculară sau nervoasă, apărută după o activitate intensă și îndelungată sau după o boală acută (febră) sau cronică (anemie); indivizii obosiți au o predispoziție cunoscută față de bolile infecțioase, deoarece mijloacele de apărare ale organismului lor (reglate de centrul nervos) sunt micșorate. Cauzele sunt multiple: acumulare de produși de catabolism în mușchi, în celulele nervoase (acid lactic, CO_2) din cauza unei lipse de oxigen; lipsa materialului energetic (glucoză) necesar

proceselor musculare sau nervoase; unele intoxicații cu produși catabolici (uree) care împiedică funcționarea celulelor musculare sau nervoase. Surmenajul, formă inițială de oboseală, este consecința unor epuizări repetate în care s-au produs alterări structurale în creier. Oboseala ușoară, o a doua etapă, poate fi învinsă printr-un efort de voință. Oboseala marcată, accentuată, poate constitui cauza unor accidente, căci produce o hipofuncție a sistemului nervos central, deci scăderea atenției și creșterea timpului reflex. Oboseala de lungă durată poate fi cauza unor boli de ficat, infecțioase sau psihice și este necesară consultația medicală.

- **Argilă pe cale bucală:** o linguriță într-un pahar cu apă, zilnic, timp de 10 până la 20 de zile.

- Să se bea apă de mare.

- **Cataplasme cu argilă**, călduțe, pe ceafă și la partea inferioară a pântecului. Se lasă două-trei ore dacă sunt bine tolerate.

OCHI BOLNAVI (de tipul: blefarite, conjunctivite, orice fel de iritații)

- **Consultație oftalmologică obligatorie.**

- Este deseori indicat un **tratament general.**

- **Cataplasme cu argilă**, în tifon, aplicate pe ochiul închis, de una-două ori pe zi, până la vindecare.

OTITE

Inflamații ale urechii mijlocii, catarale sau purulente, care pot fi acute sau cronice. Otitele catarale sunt însoțite de tulburări auditive, dureri ușoare și febră. În general sunt

urmări ale unei viroze a căilor respiratorii superioare. Otitele medii acute purulente sunt caracterizate prin dureri auriculare violente, surditate pronunțată, febră, iar dacă este perforată membrana timpanică, apare scurgerea auriculară purulentă. Otitele medii acute purulente grave sunt acelea care însoțesc bolile infecțioase (scarlatina, gripa etc.). Otitele medii supurative cronice sunt acompaniate de scurgere auriculară purulentă îndelungată, uneori de hipoacuzie, dureri și febră. Punctul de plecare se află în cavitatea nazală sau faringiană: la copii, hipertrofia amigdalelor palatine, vegetații adenoide; la adulți, deviație de sept, polipi nazali, hipertrofia de cornete și este indicată asanarea lor.

- **Cataplasme cu argilă**, puse pe ureche în așa fel încât să acopere urechea și zona din spatele ei, respectiv regiunea mastoidiană:

- în situații acute și grave, se schimbă din oră în oră sau cel mult la două ore;

- în afecțiuni ușoare sau cronice se pun doar una-două cataplasme care se țin câte două ore fiecare.

- Câteva **picături de lămâie** în urechea bolnavă, de trei ori pe săptămână, dacă nu e vorba de un timpan perforat.
- Câteva **picături de untdelemn de măsline**, cald, pus seara, la culcare, în ureche.
- **Consultație ORL.**

PALPITAȚII

Senzații nete ale bătăilor inimii, simțite de bolnav, fie printr-o tărie neobișnuită, fie printr-un ritm neregulat; sunt provocate mai ales de nervozitate, hipertiroidism, dar și de

tulburări digestive (abuz de cafea, tutun, gaze intestinale) și chiar de intoxicații; foarte rar sunt provocate de tulburări cardiace.

Pentru tratament vezi AFECȚUNI CARDIACE.

PANARIȚIU

Infecție a degetelor, în special în jurul unghilor, cu caracter purulent. Necesită de multe ori chiar intervenție chirurgicală.

Pentru tratament vezi ABCES.

PAPILOAME

Tumoare benignă plecată de la nivelul pielii sau a unor mucoase, semănând de multe ori cu o mică conopidă. Poate fi îndepărtată și chirurgical.

Pentru tratament vezi VERUCI.

PARALIZII

Nefuncționarea unor mușchi ai membrelor corpului sau ai organelor interne, datorată unor leziuni ale sistemului nervos central ori periferic. Pot fi parțiale: hemiplegii (paraplegii a unei jumătăți a corpului dreaptă sau stângă); monoplegii (a unui singur membru, picior sau mână). Sunt însoțite de o întărire (rigiditate) a mușchilor nefuncționali, uneori dureroase și duc la atrofia mușchilor. În unele afecțiuni psihice paraliziiile pot apărea prin inhibiția puternică a unor centri motori (isterii), care la un excitant electric cedează. La cea mai mică pareză trebuie consultat un medic, deoarece paraliziiile sunt afecțiuni grave și pot avea cauze multiple.

Pentru tratament vezi AFECȚIUNI NERVOASE.

PICIOARE BOLNAVE (și: diverse alte sindroame vasculare, varice)

Așa-zisul „picior de fumător“ este o boală manifestată prin obturarea arterelor care, în majoritatea cazurilor, este provocată de fumat. Nicotina atacă inima și vasele sanguine, duce la tulburări de circulație. Cel în cauză merge șchiopătând, nu-și mai simte piciorul, iar în situații extreme se ajunge la amputare. Cauzele acestei maladii pot fi: tulburări metabolice, diabetul, hipertensiunea arterială, dar la fumători riscul imbolnăvirii este mult mai ridicat.

- Se ung picioarele cu un **strat-subțire de argilă lichidă**. Se lasă așa o oră și apoi se spală. Se repetă procedura o dată sau de două ori, zilnic.
- Se poate alterna cu **aplicații de frunze de varză**.
- **Tratament general obligatoriu.**

PLEUREZIE (și: tuberculoză)

Apariția de lichid între cele două foițe pleurale în urma unui proces inflamator la nivelul acestora. Simptomele bolii sunt foarte asemănătoare celor din pleurită, localizarea durerii fiind tot de o parte a toracelui, dar mai ales dorsal ori submamar, însoțită de o tuse seacă, aspră, ce accentuează durerea. Cauzele sunt: infecția tuberculoasă, afecțiuni pulmonare virotice sau bacteriene ce se complică.

- **Cataplasme cu argilă**, călduțe, ținute două sau trei ore:
 - o zi se pun pe piept;
 - o zi se pun pe spate.

Vor fi aplicate, în funcție de localizarea lichidului, la un plămân ori la amândoi, de o parte sau de ambele părți și ale spatelui și ale pieptului.

- **Cataplasme cu argilă**, reci, una la două zile, în partea inferioară abdomenului.

ALTERNATIV:

- **Cataplasme cu argilă**, călduțe, una la două zile, pe regiunea hepatică.

Ambele se țin între două și patru ore.

DUPĂ TREI SĂPTĂMÂNI:

- **Cataplasme cu argilă**, călduțe, puse zilnic, câte trei până la șase ore, și pe piept și pe spate.

În aceeași măsură se pot face **inhalații** cu esențe aromatice.

- Trebuie însă **consultat** în tot acest timp un medic, iar inițial, când s-a declanșat boala, **de chemat urgența**.

PROSTATISM

Prostata este o glandă specifică bărbaților, amplasată înainte de vezica urinară, sub osul pubian și este traversată, central, de prima parte a uretrei. Are rolul de-a amesteca, în spermă, lichidul ei de secreție, lubrefiind mucoasa uretrală și înlesnind astfel ejacularea. Bolile prostatei pot fi: abcesul de prostată, adenomul de prostată, prostatita sau inflamația prostatei. Simptomele specifice sunt: senzații de urinare, dureri în timpul urinării, usturimi în zona rectală și sau anală.

Abcesul de prostată este provocat de un microb ce ajunge pe cale hematogenă, germenii provin de la infecții

serioase cum ar fi: amigdalita pultacee, furunculoza, infecții ale măduvei.

Adenomul de prostată, afecțiune tipică vârstnicilor peste 60 de ani, se caracterizează prin apariția unei tumori benigne, datorată modificărilor hormonale care conduce la o strâmtorare până la închiderea totală a lumenului uretrei.

Inflamația de prostată (prostatita) apare la bărbații între 20 și 40 de ani. Cauza este o infecție bacteriană intestinală, microbii putând ajunge prin uretră în prostată sau de la o blenoragie mai veche.

- **Cataplasme cu argilă, reci**, o dată sau de două ori pe zi, lăsate două până la trei ore.
- Alternativ, **aplicații de frunze de varză**.

PUROI GINGIVĂL

Pentru tratament vezi ARTRITA DENTARĂ

RAHITISM

Boală a sistemului osos, în care nu se poate depozita suficient fosfat și carbonat de calciu, astfel că oasele rămân moi și osificația întârzie. Apare mai ales în urma alimentației artificiale a sugarului în primii doi ani ai copilăriei și se datorează lipsei de vitamina D din hrană, mai rar lipsei de fosfor sau de calciu. Se observă la toate oasele: oasele craniene rămân moi și se pot deforma, dinții întârzie să apară și nu sunt regulați, toracele se strâmtează, coloana vertebrală se curbează, oasele membrilor inferioare se îndoaie din cauza greutății corpului (spre

interior, picioare X, spre exterior, picioare Y). Rahitismul poate fi însoțit și de alte tulburări metabolice cum ar fi constipație sau diaree, hepato- și splenomegalie, anemie etc. Copilul este trist, palid și rămâne mult în urmă cu întreaga dezvoltare. Rahitismul nu apare dacă din alimentația gravidei și mamei nu lipsește vitamina D.

Pentru tratament vezi OBOSEALĂ GENERALĂ.

RĂNI (și: mușcături)

Apar la nivelul țesuturilor organismului în urma acțiunii unor factori mecanici (în special obiecte tăioase) care, după natura lor, pot fi: tăiate, înțepate, împușcate, mușcate, zdrobite, penetrante, transfigurate (care străbat o regiune sau un organ de la un capăt la altul) etc. Necesită tratament urgent de oprire a hemoragiei și combatere a infecției.

- **Cataplasme cu argilă, reci**, lăsate una-două ore și schimbate de două-trei ori, zilnic.
- **Spălături cu apă sărată**.
- **Comprese cu apă argiloasă după spălătură**.

RĂNI INFECTATE (de tipul: răni gangrenoase, necroze, ulceratii, ulcere varicoase)

- **Cataplasme cu argilă, groase**. Se lasă în jur de o oră. Se schimbă mai devreme dacă apar dureri ori senzația de căldură insuportabilă (ca o arsură). Se repetă procedura de șase până la opt ori pe zi.
- **Pansament umed cu un decoct de pătlagină**: 40 g de frunze, la un litru de apă, fierte până când apa scade la jumătate. Se pune noaptea.

- **Pansament umed cu o soluție diluată de esențe aromatice, special alese.** Se lasă toată noaptea.

ATENȚIE: la începutul tratamentului se va remarca o agravare aparentă a răni (întinderea ei ori a ulcerăției) datorată eliminării țesuturilor moarte.

REUMATISM

Boală produsă la alergia organismului la infecția cu streptococ hemolitic, caracterizată prin inflamația țesutului conjunctiv din întregul organism, dar în special din articulații, inimă și vase. Infecția streptococică se localizează de obicei în faringe (amigdale), mai rar în alte focare (granulom dentar) de unde toxinele microbului difuzează în restul organismului, producând accese repetate de reumatism. Acestea se caracterizează prin febră, dureri articulare cu umflarea articulațiilor, la copii dau forme grave provocând leziuni cardiace.

Pentru tratament vezi **DURERI REUMATISMALE**.

RINICHI BOLNAVI (de tipul: nefrite, colici nefritice, litiază renală, albuminurie)

Organe simetrice, situate în cavitatea abdominală, în care se face curățirea sângelui de producții catabolismului și cei toxici, pe seama cărora se formează urina. Au formă de bob de fasole cu lungimea de 12 cm, lărgimea de 7 cm și grosimea de 3 cm și cu greutatea de 120 g fiecare. În hil se găsește artera renală (din aortă) și vena renală (duce la cava inferioară) cât și bazinetul ce se continuă spre vezica urinară cu câte un ureter. Este un organ foarte complex, având ca unitate structurală și funcțională nefronul;

filtrează ureea, acidul uric, sărurile etc. din sânge, concentrându-le în mod selectiv în urină (din 135 litri de filtrat glomerular rezultă numai 1,5 l urină pe zi). Funcția rinichiului se explorează în primul rând prin analiza urinei (microscopică, chimică, culoare, ritm, cantitate).

- **Argilă pe gură:** o linguriță de argilă la un pahar de apă, zilnic, timp de 10 la 20 de zile.
- **Cataplasme de argilă,** reci, o dată sau de două ori zilnic, lăsate două până la trei ore.
- Alternativ, **aplicații de frunze de varză,** o dată sau de două ori pe zi, ținute câte două trei ore.

SALPINGITE

Inflamația trompelor, care se extinde de cele mai multe ori și asupra ovarului (anexită), unilateral sau bilateral. Este produsă de microbi (strepto-, stafilo-, gonococi) care ajung în ele mai ales pe cale ascendentă, după un avort, naștere, sau descendentă, pe cale hematogenă, odată cu bacilul tuberculozei sau coli. Faza acută durează una-două săptămâni, este caracterizată prin dureri în partea inferioară a abdomenului, febră, menstruații prelungite. Poate duce până la acumulări de puroi în trompe și revărsarea acestuia în cavitatea peritoneală (peritonită). Faza cronică are ca urmare astuparea trompei și duce la sterilitate sau la sarcină extrauterină.

Pentru tratament vezi **METRITE**.

SINUZITE

Imflamație a sinusurilor osoase ale feței, acută sau cronică, ce poate apărea după o rinită, o gripă, după boli în

piscine. Cele acute sunt caracterizate prin dureri ce iradiază în diverse direcții, paroxistice, rareori localizate la un singur sinus și scurgere nazală purulentă. Formele cronice pot apărea brusc și sunt caracterizate prin: scurgere nazală purulentă, faringită, tuse, laringită, bronșită, dureri, astenie intelectuală, lipsa sau modificarea mirosului, febră mică, permanentă.

- **Apă argiloasă**, trasă pe nas: o linguriță de argilă la o cană de apă, preparată cu 24 de ore înainte. Procedura se face de două-trei ori zilnic și se trage apă de mai multe ori la rând pe aceeași nară.
- **Inhalații cu un amestec de uleiuri aromatice:** eucalipt, cimbru, pin, levănțică.
- La nevoie, **cataplasme cu argilă** aplicate pe aripile nasului și pe frunte.

SPASME

Tulburare de tonus muscular în sensul unei exagerări, care are un debut brusc și cuprinde musculatura involuntară. Exemple: spasmul laringian (tulburări de vorbire și de respirație); spasmul esofagian (tulburări ale tranzitului bolului alimentar); spasmul orbicular (tulburări de închidere sau deschidere a pleoapelor).

Pentru tratament vezi AFECȚIUNI NERVOASE.

TICURI

Act impulsiv, o adevărată mișcare parazită, spamodică, stereotipă. Cu ajutorul voinței persoana reușește să

blocheze apariția ticului, pentru un timp limitat, după care însă urmează o adevărată declanșare în cascadă. De obicei în stări tensionale, emoții, ticul se accentuează și dispăre în somn. Cele mai obișnuite ticuri sunt cele ale clipitului, raclarea glotei, mușcarea buzei etc. Apariția ticului este de multe ori precedată de factori stressanți sau toxici-infecțioși.

Pentru tratament vezi AFECȚIUNI NERVOASE.

TUBERCULOZĂ

Boală infecto-contagioasă, cronică, produsă de bacilul tuberculos (bacilul lui Koch). Infectarea se face pe cale respiratorie (inhalarea aerului conținând bacili tuberculoși răspândiți de bolnav) și mai rar digestivă (prin lapte), de obicei în copilărie. Infectarea organismului cu tuberculoză se traduce însă prin instalarea alergiei tuberculoase, ce poate fi pusă în evidență prin executarea intradermoreacției la tuberculină, care devine pozitivă. La copiii subalimentați sau debilitați de boli infecțioase, ca rujeola sau tusea convulsivă, perioada primară de infecție poate fi urmată de complicații foarte grave care sunt urmarea răspândirii infecției tuberculoase pe cale sanguină. Cele mai importante complicații postprimare sunt septicemia tuberculoasă cu distrugerii extinse ale plămânului. Evoluția rapidă (în câteva săptămâni) a acestor complicații le-a justificat numele de tuberculoze galopante: ele apar la adolescenții și adulții lipsiți de rezistență la infecția tuberculoasă.

Cea mai răspândită formă de tuberculoză este cea întâlnită la adolescenții sau tinerii care s-au vindecat de

infecția primară, dar s-au infectat din nou (suprainfecție) în condițiile unui organism debilitat. Această formă evoluează cronic la nivelul plămânului (ftizie pulmonară). Ea începe cu apariția unui infiltrat precoce situat de obicei spre vârful plămânilor, care, netratat, se excavează, dând naștere unei caverne, de unde infecția se răspândește în restul plămânilor, cu apariția de noi leziuni (tuberculi, noduli) care se transformă în alte caverne, putând duce la distrugerea celei mai mari părți din plămân. Urmări mai puțin grave ale răspândirii bacilului tuberculos în organism sunt leziunile tuberculoase localizate în diferite organe: meningita tuberculoasă, tuberculozele osteoarticulară, renală, intestinală, ganglionară, testicului sau trompelor etc.

Pentru tratament vezi PLEUREZIE.

TUMORI

Umflătură sau excrescență ce poate apărea la nivelul oricărui țesut sau organ și fiind urmarea unei înmulțiri celulare care nu mai ține seama de necesitățile și controlul organismului. După natura lor tumorile sunt benigne, care seamănă cu țesuturile din care au plecat, cresc încet, nu invadează țesuturile înconjurătoare, de care sunt separate printr-o capsulă, nu produc metastaze și nu recidivează dacă sunt îndepărtate chirurgical, și maligne, care nu seamănă cu țesuturile învecinate, recidivează și produc metastaze. Tumorile benigne, cele mai obișnuite, sunt: papilomul, polipul, adenomul, fibromul, angiomul, neuromul și neurinomul, iar din tumorile maligne: carcinomul și sacromul.

1. De reținut că, deseori, **cancerul** este o afecțiune generală, **tumora malignă** nefiind decât o manifestare locală a sa. Ca urmare este deosebit de important tratamentul general și alimentația naturistă, ecologică, adecvată. **Consultul medical de specialitate** este obligatoriu. Dar se pot face aplicații locale cu argilă.

INIȚIAL

- **Cataplasme cu argilă**, subțiri (0,2 cm), pe tumoră, o dată pe zi, lăsată una până la două ore.
- **Cataplasmă cu argilă** pusă imediat sub ombilic și lăsată timp de două ore.

DUPĂ O SĂPTĂMÂNĂ

- Două **cataplasme cu argilă**, una pe tumoră și una la partea inferioară a abdomenului, puse simultan și lăsate două până la trei ore.

DUPĂ ÎNCĂ O SĂPTĂMÂNĂ

- Două **cataplasme cu argilă**, groase (2 cm) puse zilnic, pe tumoră, ținute tot două-trei ore.
- Se continuă și aplicarea **cataplasmelor pe pânțece**.

DE REȚINUT : Durata aplicării procedurilor nu este limitată la un timp anume, în care tumora ar trebui să dispară și cancerul să se vindece. Metoda nu pare a fi miraculoasă. Poate fi încercată. Nu se poate spune ce rezultate are cert.

2. Tumori benigne

- **Cataplasme cu argilă**, o dată ori de două ori zilnic, lăsate trei ore.

DE REȚINUT: nici în acest caz rezultatele nu sunt miraculoase.

TUSE

Este o expirație forțată, violentă, explozivă. Timpul actului tusei sunt: inspirație rapidă și profundă a aerului, creșterea în volum și tensionare a coșului pieptului, contractarea mușchilor expiratori, închiderea spontană a glotei și apoi deschiderea ei brusc pentru a lăsa să treacă rapid curentul de aer expirat.

Este un act reflex ce pornește din numeroasele zone tusigene (ureche, faringe, laringe, mucoasa traheobronhică, pleură, plămân) care, excitate, trimit impulsuri pe căile centripete ale ramurilor nervului pneumogastric până la centrul tusei din bulbul rahidian; de aici, răspunsul la stimuli se întoarce pe căile centrifuge ale nervilor rahidieni, ajunge la mușchii abdominali, le comandă să se contracte brusc și această contracție provoacă tusea.

Tusea este un simptom de o deosebită importanță: ea poate fi seacă, uscată, neproductivă în afecțiunile pleurale, fiind obositoare și provocând insomnie; dar poate fi grasă, productivă, recunoscută ușor după tonalitatea pe care o are chiar și la bolnavii ce nu știu să expectoreze și, în acest caz, ea constituie un reflex de apărare împotriva umplerii, încălcării, căilor respiratorii de secreții patologice; poate fi aspră, dură, ca în laringite; bitonală, auzindu-se simultan două sunete, unul grav și unul ascuțit, ca în paralizia nervilor laringieni; în chinte, în reprize, ca tusea convulsivă; poate fi atât de puternică încât să provoace reflexul de vomă.

Pentru tratament vezi ASTM.

ULCERAȚII

Pierdere de substanță la nivelul pielii sau al mucoaselor, urmare a acțiunii unor factori inflamatori sau a unor tulburări trofice.

Pentru tratament vezi RĂNI INFECTATE.

ULCERE VARICOASE

Boala este cunoscută sub numele popular de „picior deschis”. Este o ulcerăție cronică ce apare la picior, care nu se vindecă, este mereu „umedă” și foarte dureroasă. Din zona ulceroasă cad mereu bucăți de carne macerată. Se localizează preferențial pe terenul varicos. Ulcerațiile rotunde ca formă le întâlnim pe partea inferioară a gleznelor. Cauzele sunt tulburările circulatorii venoase, moștenite și datorate unor dezechilibrări metabolice, statului în picioare, constipației, îmbrăcăminte neadecvate. Vulnerabile sunt persoanele cu varice. Cum se ajunge la acest stadiu: datorită tulburărilor circulației venoase, rămân resturi de substanțe pe pereții vaselor, pielea se inflamează, apare așa-zisa dermatită de blocaj. Bacterile sau ciupercile pot acționa în voie. Cea mai mică rănire locală duce la degradarea țesuturilor, apar eczeme umede, ulcerății și sângerări. Organismul încearcă să lupte prin multiplicarea numărului de leucocite, dar dizolvarea ulcerățiilor este foarte rară.

Pentru tratament vezi RĂNI INFECTATE.

ULCER GASTRIC (și: acrofacie, gastrită)

- Cataplasme cu argilă puse zilnic, pe regiunea epigastrică (în capul pieptului), între mese: se aplică la

două ore după masă și se scot cu o oră înainte de masa următoare.

- **Argilă pe cale bucală:** o jumătate de linguriță într-o jumătate de pahar cu apă, luată cu o jumătate de oră înainte de masă.

VARICE

Sunt dilatări ale venelor, vizibile sub piele, în special la gambe, având culoare albăstrui. Grosimea lor ajunge uneori la cea a unui deget. Apar și dureri sub formă de înțepături sau arsuri ce radiază până jos, în laba piciorului. Cauza o constituie o transvazare a sângelui prin pereții venelor de suprafață. Sângele, care s-a coagulat, apasă asupra pereților foarte subțiri ai acestora, le dilată și iese sub piele. Tulburările de metabolism, desfășurarea activităților stând în picioare, îmbrăcăminte foarte strânsă pe corp, precum și obezitatea, stimulează apariția „pachetelor” de varice. Pot să apară complicații: inflamații ale venelor, tromboză, ulceratii la picioare. De asemenea se poate acumula apă în piciorul respectiv (edeme). Cine suferă de varice este bine să țină picioarele cât mai mult timp ridicate. Cei în cauză pot să poarte bandaje elastice sau ciorapi speciali.

Pentru tratament vezi **PICIOARE BOLNAVE**.

VÂNĂTĂI

Pentru tratament vezi **CONTUZII**.

VERUCI (și: nevi, papiloame)

Excrescențe rotunde sau ovale la nivelul pielii, acoperite de un tegument mai îngroșat, putând fi solitare sau mai multe la un loc. La nivelul mâinii pot fi multipli și sunt considerați de natură virotică, foarte contagioși. Se mai pot localiza pe talpă, pe organele genitale, în jurul anusului. Apar, datorită lipsei de igienă și contactului cu persoanele care au negi.

- **Argilă** pusă direct pe formațiunea dermatologică și lăsată acolo cam două ore. Se repetă manevra de câteva ori zilnic.

Tratamentul este de foarte lungă durată și, de multe ori poate fi inefficient.

- Este obligatoriu un consult medical.

VEZICĂ URINARĂ BOLNAVĂ (și: cistită)

Rezervor al urinei, situată în etajul inferior al cavității abdominale. Peretele ei este format din mucoasă, submucoasă, musculoasă și adventiția peritoneală. În vezica urinară se deschid cele două uretre, venind de la rinichi, iar urina acumulată este evacuată prin canalul-uretrei. Urinarea (micțiunea) este un act voluntar, se face când vezica urinară este plină. Inflamația ei se numește cistită, care poate fi acută, cronică, nespecifică (datorită microbilor banali, strepto-stafilo-gonococi, bacilul coli) sau specifică, dată de bacilul tuberculozei. Tumorile vezicii urinare pot fi benigne – papiloame sau maligne – carcinomul. Prezența calculilor urinari poate provoca staza urinară și cistită. Incontinența urinară, ce apare uneori la copii, este o boală a

sistemului nervos, care reglează funcțiunea sfincterului vezical.

- Două cataplasme cu argilă pe zi, lăsate două până la patru ore fiecare, dacă nu apare senzația de rece sau orice altă manifestare de rău. Ele se vor aplica între mese, la distanță de ele și niciodată în timpul ciclului menstrual.

VEZICULĂ BILIARĂ

Organ cavitătar cu formă de pară în care se acumulează produsul ficatului – bila. Aceasta se varsă, în timpul digestiei din canalul cistic și coledoc în duoden. În vezica biliară produsul acumulat suferă modificări: prin absorbția de apă se concentrează, îmbogățindu-se în colesterol, care în cazuri patologice poate precipita, transformându-se în calculi biliari.

Pentru tratament vezi FICAT.

VIERMI INTESTINALI

Cei mai frecvenți viermi intestinali la om sunt: tenia (panglica), limbricii și oxiurii.

Tenia. Este un vierme lat, cu corpul alcătuit din segmente numite proglote. Se dezvoltă în intestinul omului, unde poate atinge lungimi de mai mulți metri. În corpul omenesc ajunge prin consumul de carne de vită, insuficient friptă sau fiartă. Pentru a înțelege evoluția parazitozei, trebuie să cunoaștem „ciclul” de dezvoltare al teniei. Cel infectat, adult sau copil, elimină proglote pline cu ouăle parazitului. Când fecalele ajung, ca îngrășămintă, în pășuni, fânețuri, livezi, vitele care pasc pot înghiți ouă de tenie. Așa apar în mușchii bovinelor embrionii viermelui. Omul,

la rândul său consumând carnea de vită fără a o frige, fierbe sau afuma corespunzător, este contaminat și el. Parazitul se fixează, prin capul său ca o ventuză, pe peretele intestinului și va prelua hrana din intestinul „găzduitorului” său. Cel bolnav va suferi o serie de afecțiuni: scaun neregulat, lipsa poftei de mâncare, stare de oboseală, anemie. Proglotele de dimensiuni mari ale teniei, în care se găsesc ouăle, se desprind din timp în timp și ajung prin fecale, afară din corpul omenesc. Cu aceasta ciclul se reia.

Limbricii. Infecția cu acești viermi, ce seamănă, la formă, cu râmele și care ating lungimi de 15-40 cm, apare datorită consumului de fructe și legume nespălate, infestate cu ouăle paraziților. Cei ce au limbrici acuză dureri abdominale, au vărsături, putând face, în situații grave, chiar ocluzie intestinală (când viermii fac un ghem într-o ansă intestinală) sau icter, când pătrund în căile biliare. Îndepărtarea limbricilor se obține printr-o cură specială de tratament.

Oxiurii. Sunt tot viermi cilindrici, foarte mici, care se dezvoltă în intestinul subțire al omului și ies din el prin anus, odată ajunși la maturitate. În acest moment produc, celui infestat, mâncărimi și iritații puternice ale regiunii anale. Bolnavul se scarpină, nu se spală și, ducând mâna la gură, se reinfestează. Respectarea igienei prin spălarea mâinilor după fiecare scaun și înainte de fiecare masă, este obligatorie.

Pentru tratament vezi CONSTIPAȚIE.